

Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./adventice	Nbre max. app./culture	Application
maïs	chénopode blanc	0,75 l/ha - 1 l/ha**		1	1	2-8 feuilles
	dicotylées annuelles	0,75 l/ha - 1 l/ha**		1		2-8 feuilles
	digitaires	1,5 l/ha		1		2-8 feuilles
	efficacité secondaire sur repousses de pommes de terre	1.5 l/ha		1		2-8 feuilles
	graminées annuelles	1,5 l/ha		1		2-8 feuilles
	morelle noire	0,75 l/ha - 1 l/ha**		1		2-8 feuilles
	mouron des oiseaux	0,75 l/ha - 1 l/ha**		1		2-8 feuilles
	panic pied-de-coq	1,5 l/ha		1		2-8 feuilles
	renouées	0,75 l/ha - 1 l/ha**		1		2-8 feuilles
	souchet comestible	1 l/ha *		2	2	2-6 feuilles
maïs doux	graminées annuelles	1,5 l/ha		1	1	2-8 feuilles
	digitaires	1,5 l/ha		1		2-8 feuilles
	panic pied-de-coq	1,5 l/ha		1		2-8 feuilles
	dicotylées annuelles	0,75 l/ha 1 l/ha **		1		2-8 feuilles
	chénopode blanc	0,75 l/ha 1 l/ha **		1		2-8 feuilles
	renouées	0,75 l/ha 1 l/ha **		1		2-8 feuilles
	mouron des oiseaux	0,75 l/ha 1 l/ha **		1		2-8 feuilles
	morelle noire	0,75 l/ha 1 l/ha **		1		2-8 feuilles

* en mélange avec 1 l/ha d'un produit agréé à base de 200 g/l bentazone et 200 g/l terbuthylazine

** sur adventices développées avec plus de 6 feuilles