

Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./adventice	Nbre max. app./culture	Application
bégonias tubéreux	graminées annuelles	0,5 l/ha		1	1	peu après la plantation
	dicotylées annuelles	0,5 l/ha		1		
betteraves	graminées annuelles	0,5-0,65l/ha			1,3 l/ha/année	4-6 feuilles
		1,3 l/ha				6-8 feuilles
	matricaire camomille	0,5-0,65l/ha				4-6 feuilles
		1,3 l/ha				6-8 feuilles
	morelle noire	0,5-0,65l/ha				4-6 feuilles
		1,3 l/ha				6-8 feuilles
	panic pied-de-coq	0,5-0,65l/ha				4-6 feuilles
		1,3 l/ha				6-8 feuilles
chicorée	graminées annuelles	0,1-0,6 l/ha		3	1,3 l/ha/année	1-8 feuilles, à intervalle de 8 jours
	matricaire camomille	0,1-0,6 l/ha		3		1-8 feuilles, à intervalle de 8 jours
	morelle noire	0,1-0,6 l/ha		3		1-8 feuilles, à intervalle de 8 jours
culture de racines de witloof	graminées annuelles	0,1-0,6 l/ha		3	1,3 l/ha/année	1-8 feuilles, à intervalle de 8 jours
	matricaire camomille	0,1-0,6 l/ha		3		1-8 feuilles, à intervalle de 8 jours
	morelle noire	0,1-0,6 l/ha		3		1-8 feuilles, à intervalle de 8 jours
fraisiers (champ de production) (plein air)	graminées annuelles	0,7 l/ha	30 jours	2		1-14 jours après la plantation, à un intervalle de 7-14 jours
fraisiers (champ de sélection et de multiplication)	graminées annuelles	0,7 l/ha	30 jours	2		1-14 jours après la plantation, à un intervalle de 7-14 jours
haricot	graminées annuelles	1 l/ha		1		immédiatement après le semis
maïs (sauf maïs doux)	panic pied-de-coq	1,5 l/ha			1,5 l/ha/année*	avant la levée
		0,9 l/ha				après la levée - 3-4 feuilles du maïs

* (1,6 l/ha/année sur terrains riches en humus).