

Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./adventice	Nbre max. app./culture	Application
avoine	chardons	3-4 l/ha	7 jours	1	1	maturité pâteuse du grain, les feuilles, pailles et nœuds sont complètement jaunes
	chiendent			1		
	gesse tubéreuse			1		
	mauvaises herbes			1		
épeautre	chardons	3-4 l/ha	7 jours	1	1	maturité pâteuse du grain, les feuilles, pailles et nœuds sont complètement jaunes
	chiendent			1		
	gesse tubéreuse			1		
	mauvaises herbes			1		
fèves et féveroles (récoltées sèches) (plein air)	chiendent	3-4 l/ha	7 jours	1	1	50 % des gousses mûres, graines dures et sèches
	mauvaises herbes			1		
froment	chardons	3-4 l/ha	7 jours	1	1	maturité pâteuse du grain, les feuilles, pailles et nœuds sont complètement jaunes
	chiendent			1		
	gesse tubéreuse			1		
	mauvaises herbes			1		
gazons et pelouses	mauvaises herbes	4 - 6 l/ha				
haricot récolté sec	chiendent	3-4 l/ha	7 jours	1	1	50 % des gousses mûres, graines dures et sèches
	mauvaises herbes			1		
orge	chardons	3-4 l/ha	7 jours	1	1	maturité pâteuse du grain, les feuilles, pailles et nœuds sont complètement jaunes
	chiendent			1		
	gesse tubéreuse			1		
	mauvaises herbes			1		
pois fourragers (plein air)	chiendent	3-4 l/ha	7 jours	1	1	50 % des gousses mûres, graines dures et sèches
	mauvaises herbes			1		
prairies	mauvaises herbes	4 - 6 l/ha	5 jours avant semis, pâturage, ensilage ou fenaison	1	1	

Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./adventice	Nbre max. app./culture	Application
sapin de Noël	chardons	6 l/ha				sur plantations de plus de 2 ans en automne après lignification des jeunes pousses
	chiendent	4 l/ha				
	fougères	6 l/ha				
	ortie	6 l/ha				
seigle	chardons	3-4 l/ha	7 jours	1	1	maturité pâteuse du grain, les feuilles, pailles et noeuds sont complètement jaunes
	chiendent			1		
	gesse tubéreuse			1		
	mauvaises herbes			1		
Usages non liés à une culture particulière (pour plus de détails, consulter l'étiquette)	chiendent, oseille	4 l/ha	7 jours avant de pâturer ou ensiler			Non-pertinent pour l'usage comme herbicide total ou pour le traitement des chaumes 7 jours avant l'installation de la culture ou avant le semis, ou en traitement localisé sans toucher la culture en place
	mauvaises herbes	2-4 l/ha - 2,8-4 l/ha sur végétation très développée – 3,3-5,5/ha/10 l de bouillie	7 jours avant de pâturer ou ensiler			
	plantes ligneuses	60 ml/ 5 l d'eau/ 100 m ²	7 jours avant de pâturer ou ensiler			
	armoise vulgaire, ronce commune, composées, ortie, épilobe, plantain, chardons, renoncules, fougères	6 l/ha	7 jours avant de pâturer ou ensiler			
triticale	chardons	3-4 l/ha	7 jours	1	1	maturité pâteuse du grain, les feuilles, pailles et noeuds sont complètement jaunes
	chiendent			1		
	gesse tubéreuse			1		
	mauvaises herbes			1		