

Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./maladie	Nbre max. app./culture	Application
<b>épeautre</b>	rouille brune	2l/ha		2	2	premier noeud - épiaison, préventivement ou dès l'apparition des premiers symptômes, à intervalle de 14 jours
	rouille jaune					
	septoriose des feuilles					
<b>froment</b>	rouille brune	2l/ha		2	2	premier noeud - épiaison, préventivement ou dès l'apparition des premiers symptômes, à intervalle de 14 jours
	rouille jaune					
	septoriose des feuilles					
<b>orge</b>	rhynchosporiose	2l/ha		2	2	premier noeud - épiaison, préventivement ou dès l'apparition des premiers symptômes, à intervalle de 14 jours
	rouille naine					
<b>seigle</b>	rouille brune	2l/ha		2	2	premier noeud - épiaison, préventivement ou dès l'apparition des premiers symptômes, à intervalle de 14 jours
	rouille jaune					
	septoriose des feuilles					
<b>triticale</b>	rouille brune	2l/ha		2	2	premier noeud - épiaison, préventivement ou dès l'apparition des premiers symptômes, à intervalle de 14 jours
	rouille jaune					
	septoriose des feuilles					