

Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./adventice	Nbre max. app./culture	Application
carottes (plein air)	dicotylées annuelles	5 l/ha		1	1	2-4 bladstadium
	graminées annuelles			1		
céleri-raves (plein air)	dicotylées annuelles	5 l/ha		1	1	2-4 feuilles (BBCH 12-14)
	graminées annuelles			1		
céleri à côtes (plein air)	dicotylées annuelles	5 l/ha	70 jours	1	1	2-4 feuilles (BBCH 12-14)
	graminées annuelles			1		
épeautre	dicotylées annuelles	4-5 l/ha				pré-émergence - stade 2-3 feuilles
	graminées annuelles					
escourgeon	dicotylées annuelles	4-5 l/ha				pré-émergence - stade 2-3 feuilles
	graminées annuelles					
froment d'hiver	dicotylées annuelles	4-5 l/ha				pré-émergence - stade 2-3 feuilles
	graminées annuelles					
pommes de terre (plein air) et culture de plants	dicotylées annuelles	4-5 l/ha				pré-émergence
	graminées annuelles					
seigle	dicotylées annuelles	4-5 l/ha				pré-émergence - stade 2-3 feuilles
	graminées annuelles					
triticale	dicotylées annuelles	4-5 l/ha				pré-émergence - stade 2-3 feuilles
	graminées annuelles					

Céréales:

Pour atteindre un meilleur effet du traitement et une meilleure efficacité contre la vraie camomille et le mouron, DEFI peut être utilisé en combinaison avec un herbicide à base d'isoxaben (p.ex. AZ 500, à une dose de 100-150 ml/ha). L'application sera réalisée en pré-émergence ou, de préférence, tôt en post-émergence. Le produit sera seulement appliqué sur un semis régulier de minimum 3 cm de profondeur. Sur un sol moins bien préparé (présence de mottes), sur un sol sableux, sur un sol très lourd ou sur un sol riche en humus, seule une application tôt en post-émergence est recommandée.