



Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./maladie	Nbre max. app./culture	Application
ail (plein air)	mildiou de l'oignon	2 kg/ha	28 jours	3		à intervalle de 7 jours
brocoli (plein air)	rouille blanche	2 kg/ha	28 jours	3		intervalle de 14-21 jours
chou de Bruxelles (plein air)	rouille blanche	2 kg/ha	28 jours	3		à intervalle de 14-21 jours
chou-fleur (blanc et vert) (plein air)	rouille blanche	2 kg/ha	28 jours	3		à intervalle de 14-21 jours
chou rave (plein air)	rouille blanche	2 kg/ha	14 jours	2		intervalle de 10-14 jours
échalote (plein air)	mildiou de l'oignon	2 kg/ha	14 jours			
laitues	mildiou de la laitue	1,9 kg/ha	28 jours	2		à intervalle de 7-14 jours
oignon (récolté sec) (plein air)	mildiou de l'oignon	2 kg/ha	14 jours	3		
persil	mildiou du persil	1,9 kg/ha	28 jours	2	2	
plantes ornementales (non destinées à la consommation)	mildiou des plantes ornementales	0,25 kg/100 l d'eau		2	2	intervalle de 7 jours, ne pas appliquer juste avant la récolte pour éviter la présence visible de résidus de pulvérisation
pommes de terre (plein air)	mildiou	2,5 kg/ha	14 jours	2	2	à intervalle de 10-14 jours
roquette	mildiou du chou	1,9 kg/ha	28 jours	1 par coupe	3	
scorsonère (plein air)	rouille blanche	2,5 kg/ha	60 jours	4		à intervalle de 7-14 jours
tabac	mildiou du tabac	2,5 kg/ha				à intervalle de 10 jours
vigne	mildiou des vignes	0,75 kg/ha par surface de haie	56 jours	3	3	à intervalle 10-14 jours