

Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./problème	Nbre max. app./culture	Application
avoine	verse	0,4 l/ha				début redressement - 1e noeud
colza	verse	1,2 l/ha				les boutons floraux de l'inflorescence principale sont individuellement visibles mais fermés - les boutons floraux secondaires sont individuellement visibles mais fermés
froment d'hiver (sauf multiplication de semences)	verse	0,4-0,5 l/ha				1e noeud- 2e noeud
froment de printemps (sauf multiplication de semences)	verse	0,4 l/ha				début redressement - 1e noeud
escourgeon (sauf multiplication de semences)	verse	en combinaison avec 240 g/ha d'éthefon: 0,5 l/ha seul: 0,6-0,8 l/ha, en fonction de la variété				1e noeud- 2e noeud
orge de printemps (sauf multiplication de semences)	verse	0,4-0,6 l/ha				fin tallage - 2e noeud
seigle (sauf multiplication de semences)	verse	0,4-0,5 l/ha				1e noeud- 2e noeud
triticale (sauf multiplication de semences)	verse	0,4-0,5 l/ha				1e noeud- 2e noeud
ray-grass anglais (production des semences, sauf base et pré-base)	verse	0,4-0,8 l/ha				1e noeud - 3e noeud
ray-grass italien (production des semences, sauf base et pré-base)	verse	0,4-0,8 l/ha				1e noeud - 3e noeud