

Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./insecte	Nbre max. app./culture	Application
<b>aneth</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	2	2/culture, 6/an	
	pucerons			2		
<b>angélique</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	2	2/coupe, 6/an	
	pucerons			2		
<b>asperges</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	2	2	après la récolte
	pucerons			2		
<b>bette (plein air)</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	2	2/coupe, 6/an	
	pucerons			2		
<b>betteraves</b>	altises de la betterave	1,25 l/ha	7 jours	1	1	
	pucerons			1		
	mouche de la betterave			1		
<b>betterave rouge (plein air)</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	2	2	
	pucerons			2		
<b>carottes (plein air)</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	2	2	
	pucerons			2		
<b>céleri à côtes (sous protection)</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	1	1	
	pucerons			1		
<b>céleri à couper</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	2	2/coupe, 6/an	
	pucerons			2		
<b>céleri-raves (plein air)</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	14 jours	1	1	
	pucerons			1		
<b>céréales d'hiver</b>	pucerons	0,75 l/ha	7 jours	1	1	contre les pucerons vecteurs de la jaunisse nanisante, à partir de l'apparition des pucerons, selon les avertissements.
<b>cerfeuil</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	2	2/coupe, 6/an	
	pucerons			2		
<b>cerisiers et griottiers*</b>	chenilles défoliatrices	1,2 l/ha de haie	21 jours	1	1	pas contre le puceron lanigère du pommier
	chenilles mineuses/teignes			1		
	pucerons			1		
	tordeuses du feuillage			1		
<b>chou chinois et paksoi (plein air)***</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	2	2	
	pucerons			2		

Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./insecte	Nbre max. app./culture	Application
<b>chou de Bruxelles (plein air)***</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	2	2	
	pucerons			2		
<b>chou frisé (plein air)***</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	2	2	
	pucerons			2		
<b>chou-fleur (blanc et vert) (plein air)***</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	2	2	
	pucerons			2		
<b>choux pommés (plein air)***</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	2	2	
	pucerons			2		
<b>chou-navet, rutabaga (plein air)</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	14 jours	1	1	
	pucerons			1		
<b>ciboulette</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	1	2/coupe, 6/an	
	pucerons			1		
<b>coriandre</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	2	2/coupe, 6/an	
	pucerons			2		
<b>cornichon (plein air)</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	2	2	
	pucerons			2		
<b>courgette/patisson (sous protection)</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	2	2	
	pucerons			2		
<b>cresson alénois</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	2	2/coupe, 6/an	
	pucerons			2		
<b>culture de racines de witloof</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	14 jours	1	1	
	pucerons			1		
<b>endives, radicchio rosso, pain de sucre (plein air)</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	1	1	
	pucerons			1		
<b>endives, radicchio rosso, pain de sucre (sous protection)</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	du 1/3 au 31/10: 14 jours, du 1/11 au 28/2: 28 jours	1	1	
	pucerons			1		
<b>épinard (plein air)</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	2	2	
	pucerons			2		

Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./insecte	Nbre max. app./culture	Application
<b>fèves/féveroles (sans cosse)</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	14 jours	2	2	
	pucerons			2		
<b>fraisiers (plein air)*</b>	chenilles défoliatrices	1,25 l/ha	7 jours	1	1	pas contre le puceron lanigère du pommier
	chenilles mineuses/teignes			1		
	pucerons			1		
<b>framboisiers*</b>	chenilles défoliatrices	1,2 l/ha de haie	21 jours	1	1	pas contre le puceron lanigère du pommier
	chenilles mineuses/teignes			1		
	pucerons			1		
<b>froment</b>	pucerons	0,75 l/ha	7 jours	1	1	après l'épiaison, selon les avertissements
<b>groseilliers (blancs, rouges, cassis)*</b>	chenilles défoliatrices	1,2 l/ha de haie	21 jours	1	1	pas contre le puceron lanigère du pommier
	chenilles mineuses/teignes			1		
	pucerons			1		
<b>groseilliers à maquereau*</b>	chenilles défoliatrices	1,2 l/ha de haie	21 jours	1	1	pas contre le puceron lanigère du pommier
	chenilles mineuses/teignes			1		
	pucerons			1		
<b>haricot récolté sec (plein air)</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	2	2	
	pucerons			2		
<b>haricot vert (plein air)</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	2	2	
	pucerons			2		
<b>laitues (plein air)</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	1	1	
	pucerons			1		
<b>laitues (sous protection)</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	du 1/3 au 31/10: 14 jours, du 1/11 au 28/2: 28 jours	1	1	
	pucerons			1		
<b>livèche</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	2	2/coupe, 6/an	
	pucerons			2		
<b>mâche</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	2	2/culture, 6/an	
	pucerons			2		
<b>maïs (sauf maïs doux)</b>	pucerons	1,25 l/ha		1	1	5 - 10 feuilles

Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./insecte	Nbre max. app./culture	Application
<b>navet (plein air)</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	14 jours	1	1	
	pucerons			1		
<b>panais</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	1	2	
	pucerons			1		
<b>persil (plein air)</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	2	2/coupe, 6/an	
	pucerons			2		
<b>persil à grosses racines (plein air)</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	1	2/culture, 6/an	
	pucerons			1		
<b>plantes ornementales (plein air)</b>	chenilles défoliatrices	15 ml/are		1	1	
	pucerons			1		
<b>plantes ornementales (sous protection)</b>	chenilles défoliatrices	15 ml/are				
	pucerons					
<b>poiriers*</b>	chenilles défoliatrices	1,2 l/ha de haie	7 jours	1	1	pas contre le puceron lanigère du pommier
	chenilles mineuses/teignes			1		
	pucerons			1		
	tordeuses du feuillage			1		
<b>pois récoltés secs (sans cosse) (plein air)**</b>	pucerons	1,25 l/ha	28 jours	2	2	
	sitone des pois			2		
	thrips			2		
	tordeuse du pois			2		
<b>pois verts (mange-tout) (plein air)**</b>	pucerons	1,25 l/ha	7 jours	2	2	
	sitone des pois			2		
	thrips			2		
	tordeuse du pois			2		
<b>petit pois (sans cosse) (plein air)**</b>	pucerons	1,25 l/ha	7 jours	2	2	
	sitone des pois			2		
	thrips			2		
	tordeuse du pois			2		

Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./insecte	Nbre max. app./culture	Application
<b>pommes de terre (plein air)</b>	doryphore de la pomme de terre	1,5 l/ha	7 jours	1	1	seulement en cas d'atteinte très lourde
	pucerons	1,25 l/ha		1		
<b>pommiers*</b>	chenilles défoliatrices	1,2 l/ha de haie	7 jours	1	1	pas contre le puceron lanigère du pommier
	chenilles mineuses/teignes			1		
	pucerons			1		
	tordeuses du feuillage			1		
<b>pruniers*</b>	chenilles défoliatrices	1,2 l/ha de haie	7 jours	1	1	pas contre le puceron lanigère du pommier
	chenilles mineuses/teignes			1		
	pucerons			1		
	tordeuses du feuillage			1		
<b>radis (plein air)</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	2	2	
	pucerons			2		
<b>radis noir, radis rave (plein air)</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	2	2	
	pucerons			2		
<b>raifort (plein air)</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	1	2	
	pucerons			1		
<b>ronces (mûres)*</b>	chenilles défoliatrices	1,2 l/ha de haie	21 jours	1	1	pas contre le puceron lanigère du pommier
	chenilles mineuses/teignes			1		
	pucerons			1		
<b>roquette</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	2	2/coupe, 6/an	
	pucerons			2		
	sitone			2		
<b>scorsonère (plein air)</b>	chenilles défoliatrices	1,5 l/ha	7 jours	1	2	
	pucerons			1		
<b>tabac</b>	pucerons	1,5 l/ha		1	1	

\* action secondaire contre l'araignée rouge.

\*\* action secondaire contre la cécidomie du pois.

\*\*\* le produit est moins efficace contre Brevicoryne brassicae .