

Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./maladie	Nbre max. app./culture	Application
<b>épeautre</b>	rhynchosporiose	2,5 l/ha		2	2	2ème noeud - fin épiaison, à intervalle de 21 jours
	rouille brune			2		
	rouille jaune			2		
	septoriose de l'épi			2		
	septoriose des feuilles			2		
<b>froment</b>	rouille brune	2,5 l/ha		2	2	2ème noeud - fin épiaison, à intervalle de 21 jours
	rouille jaune			2		
	septoriose de l'épi			2		
	septoriose des feuilles			2		
<b>orge</b>	helminthosporiose	2,5 l/ha		2	2	2ème noeud - dernière feuille, à intervalle de 21 jours
	rhynchosporiose			2		
	rouille naine			2		
<b>seigle</b>	rhynchosporiose	2,5 l/ha		2	2	2ème noeud - fin épiaison, à intervalle de 21 jours
	rouille brune			2		
	rouille jaune			2		
	septoriose de l'épi			2		
	septoriose des feuilles			2		
<b>triticale</b>	rhynchosporiose	2,5 l/ha		2	2	2ème noeud - fin épiaison, à intervalle de 21 jours
	rouille brune			2		
	rouille jaune			2		
	septoriose de l'épi			2		
	septoriose des feuilles			2		