| Culture | Agréé pour lutter contre | Dose | Délai avant récolte | Nbre max. app./maladie | Nbre max. app./culture | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ail (plein air)** | rouille | 1 l/ha | 14 jours | 2 | 2 | préventivement ou à l'apparition des premiers symptômes, à intervalle de 8-10 jours |
| **angélique, livèche, persil à grosse racines** | septoriose | 1 l/ha | 7 jours | 1 | 1 | |
| **asperge (plein air)** | rouille de l'asperge | 1 l/ha | | 2 | 2 | après la récolte, préventivement ou à l'apparition des premiers symptômes, à intervalle de 14 jours |
| | stemphyliose | | | 2 | | |
| **asperge (sous protection)** | rouille de l'asperge | 1 l/ha | | 2 | 2 | après la récolte, préventivement ou à l'apparition des premiers symptômes, à intervalle de 14 jours |
| | stemphyliose | | | 2 | | |
| **betterave rouge (plein air)** | cercosporiose | 1 l/ha | 14 jours | 2 | 2 | |
| | oïdium | | | 2 | | |
| **carottes (plein air)** | alternariose, brûlure des feuilles de la carotte | 1 l/ha | 14 jours | 2 | 2 | préventivement ou à l'apparition des premiers symptômes, à intervalle de 14-21 jours |
| | oïdium | | | 2 | | |
| **céleri à côtes** | septoriose du céleri | 0,8 l/ha | 14 jours | 2 | 2 | préventivement ou à l'apparition des premiers symptômes, à intervalle de 7 jours |
| **céleri-raves (plein air)** | septoriose du céleri | 0,8 l/ha | 14 jours | 2 | 2 | préventivement ou à l'apparition des premiers symptômes, à intervalle de 7 jours |
| **chicorée** | alternariose | 1 l/ha | 21 jours | 1 | 1 | |
| | rouille | | | 1 | | |
| **chou brocoli (plein air)** | alternariose | 1 l/ha | 14 jours | 2 | 2 | intervalle de 14 jours |
| **chou chinois et pakchoï (plein air)** | alternariose | 1 l/ha | 14 jours | 2 | 2 | intervalle de 14 jours |
| | rouille blanche | | | 2 | | |
| **chou de Bruxelles (plein air)** | alternariose | 1 l/ha | 14 jours | 2 | 2 | intervalle de 14 jours |
| | rouille blanche | | | 2 | | |
| **chou rave (plein air)** | alternariose | 1 l/ha | 14 jours | 2 | 2 | intervalle de 14 jours |
| | rouille blanche | | | 2 | | |

| Culture | Agréé pour lutter contre | Dose | Délai avant récolte | Nbre max. app./maladie | Nbre max. app./culture | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **chou-fleur (blanc et vert) (plein air)** | alternariose | 1 l/ha | 14 jours | 2 | 2 | intervalle de 14 jours |
| | rouille blanche | | | 2 | | |
| **choux pommés (plein air)** | alternariose | 1 l/ha | 14 jours | 2 | 2 | intervalle de 14 jours |
| | rouille blanche | | | 2 | | |
| **courgette/pâtisson** | cladosporiose | 1 l/ha | 1 jour | 2 | 2 | intervalle de 7 jours |
| **culture de racines de witloof** | alternariose | 1 l/ha | 21 jours | 1 | 1 | |
| | rouille | | | 1 | | |
| **échalote (plein air)** | mildiou de l'oignon | 0,8 - 1 l/ha | 14 jours | 4 | 4 | préventif ou à l'apparition des premiers symptômes, à intervalle de 7-10 jours |
| | brûlure des feuilles de l'oignon | | | 4 | | |
| **fenouil** | cercosporiose | 0,8 l/ha | 14 jours | 2 | 3 | préventif ou à l'apparition des premiers symptômes, à intervalle de 7 jours |
| | sclérotiniose | 1 l/ha | | 3 | | préventif ou à l'apparition des premiers symptômes, à intervalle de 14-21 jours |
| **fèves et féveroles (plein air)** | anthracnose | 1 l/ha | 14 jours | 1 | 1 | floraison |
| | pourriture grise | | | 1 | | |
| **laitues (plein air et sous protection)** | mildiou de la laitue | 1 l/ha | 14 jours (plein air) / 30 jours (sous protection) | 2 | 4/12 mois dont max. 2/culture | à intervalle de 7-14 jours |
| | rhizoctone | | | 2 | | |
| **mâche (plein air)** | rhizoctone | 1 l/ha | | 1 | | 14 jours après le semis ou la plantation |
| **mâche (sous protection)** | rhizoctone | 1 l/ha | | 1 | | 14 jours après le semis ou la plantation |
| **navet (plein air)** | alternariose | 1 l/ha | 14 jours | 2 | | préventif ou à l'apparition des premiers symptômes, à intervalle de 14 jours |
| **oignon (plein air et sous protection)** | mildiou de l'oignon | 0,8 - 1 l/ha | 14 jours | 4 | 4 | préventif ou à l'apparition des premiers symptômes, à intervalle de 7-10 jours |
| | brûlure des feuilles de l'oignon | | | 4 | | |
| **oignons de printemps (plein air et sous protection)** | mildiou de l'oignon | 0,8 - 1 l/ha | 7 jours | 4 | 4 | préventif ou à l'apparition des premiers symptômes, à intervalle de 7-10 jours |
| | brûlure des feuilles de l'oignon | | | 4 | | |
| **panais (plein air)** | alternariose, brûlure des feuilles de la carotte | 1 l/ha | 14 jours | 2 | 2 | préventif ou à l'apparition des premiers symptômes, à intervalle de 14-21 jours |
| | oïdium | | | 2 | | |

| Culture | Agréé pour lutter contre | Dose | Délai avant récolte | Nbre max. app./maladie | Nbre max. app./culture | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **plantes ornementales** | alternariose, ascochyta, cladosporium , oïdium, rouille blanche, rouille, septoriose, stemphylium | 100 ml/100 l d'eau | | 2 | 2 | |
| **poireau (plein air)** | alternariose du poireau | 1 l/ha | 21 jours | 3 | 3 | préventif ou à l'apparition des premiers symptômes, à intervalle de 21 jours |
| | mildiou du poireau | | | 3 | | |
| | rouille | | | 3 | | |
| **pois (plein air)** | anthracnose | 1 l/ha | 14 jours | 1 | 1 | floraison |
| | oïdium | | | 1 | | |
| | pourriture grise | | | 1 | | |
| | rouille du pois | | | 1 | | |
| **radis (plein air et sous protection)** | alternariose | 1 l/ha | 7 jours (plein air) / 21 jours (sous protection) | 1 | 1 | |
| | rouille blanche | | | 1 | | |
| **radis noir et radis rave (plein air et sous protection)** | alternariose | 1 l/ha | 7 jours (plein air) / 21 jours (sous protection) | 1 | 1 | |
| | rouille blanche | | | 1 | | |
| **raifort (plein air et sous protection)** | alternariose | 1 l/ha | 7 jours (plein air) / 14 jours (sous protection) | 1 | 1 | |
| | rouille blanche | | | 1 | | |
| **witloof (forcerie en fosse)** | mildiou | 1ml/m² | | | | à la mise en place, sur le collet des racines |
| **witloof (forcerie hydroponique)** | mildiou | 1ml/m² | | | | à la mise en place, sur le collet des racines |