

Culture	Agréé pour lutter contre	Dose	Délai avant récolte	Nbre max. app./adventice	Nbre max. app./culture	Application
avoine	mauvaises herbes	2-4 l/ha	7 jours	1	1*	maturation complète, grain dur
	rejets de céréales			1		
colza	mauvaises herbes	3 l/ha	4 jours	1	*	80% des siliques sont à maturité – maturation complète: presque toutes les siliques sont à maturité
culture de plants de pommes de terre	fanés de pommes de terre	2-5 l/ha	4 jours	1**	*	
houblon	croissance excessive des tiges et des feuilles	1,8 l/ 1120 l d'eau/ha			*	appliquer en juillet sur les 90-120 premiers cm en bas du tronc de houblon
maïs	mauvaises herbes	2-4 l/ha	7 jours	1	1*	maturation complète, grain dur
	rejets de céréales			1		
orge	mauvaises herbes	2-4 l/ha	7 jours	1	1*	maturation complète, grain dur
	rejets de céréales			1		
pois fourragers (plein air)	mauvaises herbes	3 l/ha	4 jours	1	*	avant la récolte, maturation complète ; tout au plus 8 jours avant la récolte
potatoes (plein air)	fanés de pommes de terre	3-5 l/ha	4 jours	1**	*	
terres agricoles en interculture	mauvaises herbes	3 à 5 l/ha		2	*	au plus tard 1 jour avant l'émergence, le semis ou la plantation, végétation développée
toutes cultures	mauvaises herbes	3 à 5 l/ha	10 jours avant la fauche, l'ensilage ou le pâturage	2	*	au plus tard 1 jour avant l'émergence, le semis ou la plantation, végétation développée
verger	drageons du pied des arbres fruitiers	0,5 l/hl		2	*	intervalle de 7 jours