



Thiovit Jet®

syngenta

| Culture | Agréé pour lutter contre | Dose | Délai avant récolte | Nbre max. app./maladie | Nbre max. app./culture | Application |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| airelles | oïdium du groseillier | 3-6 kg/ha | | | | |
| arbres fruitiers | oïdium | 2-4 kg/ha de haies fruitières | | | | |
| arbres et arbustes ornementaux | tavelure | 0,2 - 0,4 kg/100 l d'eau | | | | |
| betteraves | oïdium | 7,5 kg/ha | | | | |
| céréales | oïdium | 4-5 kg/ha | | | | |
| cultures maraîchères | oïdium | 5 kg/ha | | | | |
| fraisiers | oïdium | 50 g/are | | | | |
| framboisiers | oïdium | 3-6 kg/ha | | | | |
| groseilliers (blancs, rouges, cassis) | oïdium du groseillier | 3-6 kg/ha | | | | |
| groseilliers à maquereau | oïdium du groseillier | 3-6 kg/ha | | | | |
| houblon | oïdium | 500 g/100 l d'eau | | | | |
| myrtilles | oïdium du groseillier | 3-6 kg/ha | | | | |
| plantes ornementales | oïdium | 500 g/100 l d'eau | | | | |
| poiriers | tavelure du poirier | 2-4 kg/ha de haies fruitières | | | | |
| pommiers | tavelure du pommier | 2-4 kg/ha de haies fruitières | | | | |
| ronces (mûres) | oïdium | 3-6 kg/ha | | | | |
| vigne | oïdium de la vigne | 300-500 g/100 l d'eau | | | | après la floraison |
| | | 600-800 g/100 l d'eau | | | | avant la floraison |
| | phytopte de la vigne | 300-500 g/100 l d'eau | | | | après la floraison |
| | | 600-800 g/100 l d'eau | | | | avant la floraison |