

Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ziekte	Max. toepassing/teelt	Toepassing
aardappelen (open lucht)	Phytophthora	1ste behandeling: 2,25 l/ha. 2de behandeling: 2,50 l/ha. 3de behandeling: 2,75 l/ha. volgende behandelingen: 3 l/ha.	7 dagen		8	
gerst	bladvlekkenziekte	2 l/ha		2	2	ligula zichtbaar
	netvlekkenziekte/strepenziekte			2		
	roesten			2		
groengeoogste erwten (met peul) (open lucht)	anthracnose	3 l/ha	14 dagen	2	2	begin bloei - einde bloei
	grauwe schimmel			2		
groengeoogste erwten (zonder peul) (open lucht)	anthracnose	3 l/ha	14 dagen	2	2	begin bloei - einde bloei
	grauwe schimmel			2		
schorseneren (open lucht)	witte roest	2 l/ha met een product dat erkend is tegen witziekte.	90 dagen			bij het verschijnen van de symptomen, met een interval van 14-21 dagen
sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie)	Cylindrocladium spp.	0,3 l/100 l		3	3	met een interval van 7-14 dagen
tarwe	bladvlekkenziekte/septoriose	2 l/ha		2	2	tweede knoop - aarvorming
	bruine roest			2		
	gele roest			2		
	kafjesbruin			2		
tomaten (onder bescherming)	Phytophthora	1,1-1,5 l/ha haag	3 dagen	2		
triticale	bladvlekkenziekte/septoriose	2 l/ha		2	2	tweede knoop - aarvorming
	bruine roest					
	gele roest					
	kafjesbruin					

Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ ziekte	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
<b>vicia-bonen (groengeogst, zonder peul) (open lucht)</b>	anthracnose	3 l/ha	10 dagen	2	2	begin bloei - einde bloei
	grauwe schimmel			2		
<b>sierplanten (niet houtachtig) (niet bestemd voor consumptie)</b>	alternaria	0,3 l/100 l				
	ascochyta					
	drechslera iridis					
	grauwe schimmel					
	Mycosphaerella					
	septoria					
	stagonospora					
<b>sierplanten (niet bestemd voor consumptie)</b>	blad-en takphytophthora en valse meeldauw	0,3 l/100 l		3	3	met een interval van 7-14 dagen
	roesten					