

| Teelt   | Erkend ter bestrijding van          | Dosis    | Veiligheidstermijn | Max. toepassing/<br>onkruid | Max. toepassing/<br>teelt | Toepassing                     |
|---|-------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>aardappelen (open lucht) en<br/>pootaardappelteelt</b> | eenjarige grasachtige onkruiden     | 4-5 l/ha |                    |                             |                           | voor-opkomst                   |
|   | eenjarige tweezaadlobbige onkruiden |          |                    |                             |                           |                                |
| <b>bleekselderij (open lucht)</b>                         | eenjarige grasachtige onkruiden     | 5 l/ha   | 70 dagen           | 1                           | 1                         | 2-4 bladstadium (BBCH 12-14)   |
|   | eenjarige tweezaadlobbige onkruiden |          |                    | 1                           |                           |                                |
| <b>knolselder (open lucht)</b>                            | eenjarige grasachtige onkruiden     | 5 l/ha   |                    | 1                           | 1                         | 2-4 bladstadium (BBCH 12-14)   |
|   | eenjarige tweezaadlobbige onkruiden |          |                    | 1                           |                           |                                |
| <b>rogge</b>  | eenjarige grasachtige onkruiden     | 4-5 l/ha |                    |                             |                           | voor-opkomst - 2-3 bladstadium |
|   | eenjarige tweezaadlobbige onkruiden |          |                    |                             |                           |                                |
| <b>spelt</b>  | eenjarige grasachtige onkruiden     | 4-5 l/ha |                    |                             |                           | voor-opkomst - 2-3 bladstadium |
|   | eenjarige tweezaadlobbige onkruiden |          |                    |                             |                           |                                |
| <b>triticale</b>  | eenjarige grasachtige onkruiden     | 4-5 l/ha |                    |                             |                           | voor-opkomst - 2-3 bladstadium |
|   | eenjarige tweezaadlobbige onkruiden |          |                    |                             |                           |                                |
| <b>wintergerst</b>  | eenjarige grasachtige onkruiden     | 4-5 l/ha |                    |                             |                           | voor-opkomst - 2-3 bladstadium |
|   | eenjarige tweezaadlobbige onkruiden |          |                    |                             |                           |                                |
| <b>wintertarwe</b>  | eenjarige grasachtige onkruiden     | 4-5 l/ha |                    |                             |                           | voor-opkomst - 2-3 bladstadium |
|   | eenjarige tweezaadlobbige onkruiden |          |                    |                             |                           |                                |
| <b>wortelen (open lucht)</b>                              | eenjarige grasachtige onkruiden     | 5 l/ha   |                    | 1                           | 1                         | 2-4 bladstadium                |
|   | eenjarige tweezaadlobbige onkruiden |          |                    | 1                           |                           |                                |

**Granen:** Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan DEFI in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben gebruikt worden (b.v. AZ 500, aan de dosis van 100-150 ml/ha). De toepassing zal gebeuren in voor-opkomst of, bij voorkeur, in vroege na-opkomst. Het product zal slechts toegepast worden bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte. Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt enkel een vroege na-opkomstbehandeling aanbevolen.

Het product werkt tegen o.a. duist en windhalm, en o.a. tegen parsee dovenetel, hoenderbeet, kleefkruid, ereprijs. Dit product mag niet worden gemengd met ureumverbindingen.