

Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ onkruid	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
<b>aardbeien (productieveld) (open lucht)</b>	eenjarige grasachtige onkruiden	0,7 l/ha	30 dagen	2		1-14 dagen na het uitplanten, met een interval van 7-14 dagen
<b>aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld)</b>	eenjarige grasachtige onkruiden	0,7 l/ha	30 dagen	2		1-14 dagen na het uitplanten, met een interval van 7-14 dagen
<b>bieten</b>	eenjarige grasachtige onkruiden	0,5-0,65l/ha			1,3 l/ha/jaar	4-6 bladeren
		1,3 l/ha				6-8 bladeren
	kamille (echte)	0,5-0,65l/ha				4-6 bladeren
		1,3 l/ha				6-8 bladeren
	zwarte nachtschade	0,5-0,65l/ha				4-6 bladeren
		1,3 l/ha				6-8 bladeren
	hanenpoot	0,5-0,65l/ha				4-6 bladeren
		1,3 l/ha				6-8 bladeren
<b>cichorei</b>	eenjarige grasachtige onkruiden	0,1-0,6 l/ha		3	1,3 l/ha/jaar	1-8 bladeren, met een interval van 8 dagen
	kamille (echte)			3		
	zwarte nachtschade			3		
<b>knolbegonia</b>	eenjarige grasachtige onkruiden	0,5 l/ha		1	1	kort na het planten
	eenjarige tweezaadlobbige onkruiden	0,5 l/ha		1		
<b>maïs (behalve suikermaïs)</b>	hanenpoot	1,5 l/ha			1,5 l/ha/jaar*	voor opkomst
		0,9 l/ha				na-opkomst - 3-4 bladeren
<b>stamslabonen (prinsesse-, snijboon)</b>	eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha		1		onmiddellijk na het zaaien
<b>witloofwortelteelt</b>	eenjarige grasachtige onkruiden	0,1-0,6 l/ha		3	1,3 l/ha/jaar	1-8 bladeren, met een interval van 8 dagen
	kamille (echte)			3		
	zwarte nachtschade			3		

\* (1,6 l/ha/jaar op humusrijke bodems)