



Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ ziekte	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
aardappelen (open lucht)	Phytophthora	2,5 kg/ha	14 dagen	2	2	interval van 10-14 dagen
bloemkool (witte en groene) (open lucht)	witte roest	2 kg/ha	28 dagen	3		interval van 14-21 dagen
broccoli (open lucht)	witte roest	2 kg/ha	28 dagen	3		interval van 14-21 dagen
druivelaars	valse meeldauw	0,75 kg/ha	56 dagen	3	3	
knoflook (open lucht)	valse meeldauw	2 kg/ha	28 dagen	3		interval van 7 dagen
koolrabi (open lucht)	witte roest	2 kg/ha	14 dagen	2		interval van 10-14 dagen
peterselie	valse meeldauw	1,9 kg/ha	28 dagen	2	2	
rucola	valse meeldauw	1,9 kg/ha	28 dagen	1 per snede	3	
schorseneren (open lucht)	witte roest	2,5 kg/ha	60 dagen	4		interval van 7-14 dagen
sierplanten (niet bestemd voor consumptie)	blad-en takphytophthora en valse meeldauw	0,25 kg/100 l water		2	2	interval van 7 dagen, niet te gebruiken kort voor de oogst vanwege zichtbaar spuit residu
sjalot (open lucht)	valse meeldauw	2 kg/ha	14 dagen			
slasoorten	valse meeldauw	1,9 kg/ha	28 dagen	2		interval van 7-14 dagen
spruitkool (open lucht)	witte roest	2 kg/ha	28 dagen	3		interval van 14-21 dagen
tabak	valse meeldauw, blauwe schimmel	2,5 kg/ha				interval van 10 dagen
uien (drooggeogste) (open lucht)	valse meeldauw	2 kg/ha	14 dagen	3		