

| Teelt | Erkend ter bestrijding van | Dosis | Veiligheidstermijn | Max. toepassing/ ziekte | Max. toepassing/ teelt | Toepassing |
|------------------|--------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| spelt | bladvlekkenziekte | 2,5 l/ha | | 2 | 2 | 2de knoop - einde aarvorming, met een interval van 21 dagen |
| | bladvlekkenziekte/septoriose | | | 2 | | |
| | bruine roest | | | 2 | | |
| | gele roest | | | 2 | | |
| | kafjesbruin | | | 2 | | |
| tarwe | bladvlekkenziekte/septoriose | 2,5 l/ha | | 2 | 2 | 2de knoop - einde aarvorming, met een interval van 21 dagen |
| | bruine roest | | | 2 | | |
| | gele roest | | | 2 | | |
| | kafjesbruin | | | 2 | | |
| gerst | bladvlekkenziekte | 2,5 l/ha | | 2 | 2 | 2de knoop - laatste blad, met een interval van 21 dagen |
| | dwegroest | | | 2 | | |
| | netvlekkenziekte/strepenziekte | | | 2 | | |
| rogge | bladvlekkenziekte | 2,5 l/ha | | 2 | 2 | 2de knoop - einde aarvorming, met een interval van 21 dagen |
| | bladvlekkenziekte/septoriose | | | 2 | | |
| | bruine roest | | | 2 | | |
| | gele roest | | | 2 | | |
| | kafjesbruin | | | 2 | | |
| triticale | bladvlekkenziekte | 2,5 l/ha | | 2 | 2 | 2de knoop - einde aarvorming, met een interval van 21 dagen |
| | bladvlekkenziekte/septoriose | | | 2 | | |
| | bruine roest | | | 2 | | |
| | gele roest | | | 2 | | |
| | kafjesbruin | | | 2 | | |