

Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ziekte	Max. toepassing/teelt	Toepassing
<b>asperge (open lucht)</b>	roest	1 l/ha		2	2	na de oogst, preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen, interval 14 dagen
	stemphylium-stengelsterfte			2		
<b>asperge (onder bescherming)</b>	roest	1 l/ha		2	2	na de oogst, preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen, interval 14 dagen
	stemphylium-stengelsterfte			2		
<b>bleekselderij</b>	bladvlekkenziekte	0,8 l/ha	14 dagen	2	2	preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen, met een interval van 7 dagen
<b>bloemkool (witte en groene) (open lucht)</b>	spikkelziekte, alternaria	1 l/ha	14 dagen	2	2	met een interval van 14 dagen
	witte roest			2		
<b>bosuien (lente-ui) (open lucht)</b>	valse meeldauw	0,8 - 1 l/ha	7 dagen	4	4	preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen, met een interval van 7-10 dagen
	witvlekkenziekte (ui, sjalot)			4		
<b>bosuien (lente-ui) (onder bescherming)</b>	valse meeldauw	0,8 - 1 l/ha	7 dagen	4	4	preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen, met een interval van 7-10 dagen
	witvlekkenziekte (ui, sjalot)			4		
<b>broccoli (open lucht)</b>	spikkelziekte, alternaria	1 l/ha	14 dagen	2	2	met een interval van 14 dagen
<b>chinese kool, paksoi en tatsoi (open lucht)</b>	spikkelziekte, alternaria	1 l/ha	14 dagen	2	2	met een interval van 14 dagen
	witte roest			2		
<b>cichorei</b>	alternaria	1 l/ha	21 dagen	1	1	
	roest			1		
<b>courgette/patison</b>	vruchtvuur	1 l/ha	1 dag	2	2	met een interval van 7 dagen
<b>engelwortel, lavas, maggiplant, wortelpeterselie</b>	bladvlekkenziekte	1 l/ha	7 dagen	1	1	
<b>erwten (open lucht)</b>	anthracnose	1 l/ha	14 dagen	1	1	bloei
	echte meeldauw			1		
	grauwe schimmel			1		
	roest			1		
<b>knoflook (open lucht)</b>	roest	1 l/ha	14 dagen	2	2	preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen, met een interval van 8-10 dagen
<b>knolselder (open lucht)</b>	bladvlekkenziekte	0,8 l/ha	14 dagen	2	2	preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen, met een interval van 7 dagen
<b>pastinaak (open lucht)</b>	alternaria	1 l/ha	14 dagen	2	2	preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen, met een interval van 14-21 dagen
	echte meeldauw			2		

Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ziekte	Max. toepassing/teelt	Toepassing
<b>knolvenkel</b>	bladvlekkenziekte	0,8 l/ha	14 dagen	2	3	preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen, met een interval van 7 dagen
	sclerotienrot (sclerotinia)	1 l/ha		3		preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen, met een interval van 14-21 dagen
<b>koolrabi (koolraap-boven-de-grond) (open lucht)</b>	spikkelziekte, alternaria	1 l/ha	14 dagen	2	2	met een interval van 14 dagen
	witte roest			2		
<b>koolraap (open lucht)</b>	spikkelziekte, alternaria	1 l/ha	14 dagen	2		preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen, met een interval van 14 dagen
<b>mierikswortel (open lucht en onder bescherming)</b>	spikkelziekte, alternaria	1 l/ha	7 dagen (open lucht)/ 14 dagen (onder bescherming)	1	1	
	witte roest			1		
<b>prei (open lucht)</b>	papiervlekkenziekte	1 l/ha	21 dagen	3	3	preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen, met een interval van 21 dagen
	purpervlekkenziekte			3		
	roest			3		
<b>raap (stoppelraap, meiraap) (open lucht)</b>	spikkelziekte, alternaria	1 l/ha	14 dagen	2		preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen, met een interval van 14 dagen
<b>radijs (open lucht en onder bescherming)</b>	spikkelziekte, alternaria	1 l/ha	7 dagen (open lucht)/ 21 dagen (onder bescherming)	1	1	
	witte roest			1		
<b>rammenas en rettich (open lucht en onder bescherming)</b>	spikkelziekte, alternaria	1 l/ha	7 dagen (open lucht)/ 21 dagen (onder bescherming)	1	1	
	witte roest			1		
<b>rode biet (open lucht)</b>	cercospora-bladvlekkenziekte	1 l/ha	14 dagen	2	2	met een interval van 14-21 dagen
	echte meeldauw			2		
<b>sierplanten</b>	alternaria	100 ml/100 l water		2	2	
	ascochyta			2		
	cladosporium			2		
	echte meeldauw			2		
	witte roest			2		
	roest			2		
	septoria			2		
	stemphylium			2		
<b>sjalot (open lucht)</b>	valse meeldauw	0,8 - 1 l/ha	14 dagen	4	4	preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen, met een interval van 7-10 dagen
	witvlekkenziekte (ui, sjalot)			4		

Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ ziekte	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
<b>slasoorten (open lucht)</b>	valse meeldauw	1 l/ha	14 dagen	2	4/12 maanden waarvan 2/teelt	met een interval van 7-14 dagen
	zwartrot (rhizoctonia)					
<b>slasoorten (onder bescherming)</b>	valse meeldauw	1 l/ha	30 dagen		4/12 maanden waarvan 2/teelt	met een interval van 7-14 dagen
	zwartrot (rhizoctonia)					
<b>sluitkool (kabuiskool) (open lucht)</b>	spikkelziekte, alternaria	1 l/ha	14 dagen	2	2	met een interval van 14 dagen
	witte roest			2		
<b>spruitkool (open lucht)</b>	spikkelziekte, alternaria	1 l/ha	14 dagen	2	2	met een interval van 14 dagen
	witte roest			2		
<b>uien (open lucht)</b>	valse meeldauw	0,8 - 1 l/ha	14 dagen	4	4	preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen, met een interval van 7-10 dagen
	witvlekkenziekte (ui, sjalot)			4		
<b>veldsla (open lucht)</b>	zwartrot (rhizoctonia)	1 l/ha		1		14 dagen na zaaien of planten
<b>veldsla (onder bescherming)</b>	zwartrot (rhizoctonia)	1 l/ha		1		14 dagen na zaaien of planten
<b>viciabonen (paarde-, duive-, tuin-,...) (open lucht)</b>	anthracnose	1 l/ha	14 dagen	1	1	bloei
	grauwe schimmel			1		
<b>witloof en roodloof (forcerie grondteelt)</b>	phytophthora cryptogea	1ml/m <sup>2</sup>				bij het intafelen, over de wortelkragen
<b>witloof en roodloof (forcerie hydrocultuur)</b>	phytophthora cryptogea	1ml/m <sup>2</sup>				bij het intafelen, over de wortelkragen
<b>witloofwortelteelt</b>	alternaria	1 l/ha	21 dagen	1	1	
	roest			1		
<b>wortelen (open lucht)</b>	alternaria	1 l/ha	14 dagen	2	2	preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen, met interval van 14-21 dagen
	echte meeldauw			2		