

Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ziekte	Max. toepassing/teelt	Toepassing
<b>asperge (open lucht)</b>	grauwe schimmel	1 l/ha		2	2	na de oogst, preventief of vanaf het verschijnen van de symptomen, met een interval van 14 dagen
	roest			2		
	stemphylium-stengelsterfte			2		
<b>bleekselderij</b>	bladvlekkenziekte	1 l/ha	14 dagen	3		preventief of vanaf het verschijnen van de symptomen, met een interval van 14 dagen
<b>bloemkool (witte en groene) (open lucht)</b>	spikkelziekte, alternaria	1 l/ha	21 dagen	2	2	preventief of vanaf het verschijnen van de symptomen, met een interval van 14 dagen
	witte roest			2		
	zwartevlekkenziekte			2		
<b>boerenkool (krulool) (open lucht)</b>	spikkelziekte, alternaria	1 l/ha	21 dagen	2	2	preventief of vanaf het verschijnen van de symptomen, met een interval van 14 dagen
	witte roest			2		
	zwartevlekkenziekte			2		
<b>broccoli (open lucht)</b>	spikkelziekte, alternaria	1 l/ha	21 dagen	2	2	preventief of vanaf het verschijnen van de symptomen, met een interval van 14 dagen
	witte roest			2		
	zwartevlekkenziekte			2		
<b>cichorei</b>	echte meeldauw	1 l/ha	30 dagen	1	1	preventief of vanaf het verschijnen van de symptomen
	roest			1		
	spikkelziekte, alternaria			1		
<b>chinese kool, paksoi en tatsoi (open lucht)</b>	spikkelziekte, alternaria	1 l/ha	21 dagen	2	2	preventief of vanaf het verschijnen van de symptomen, met een interval van 14 dagen
	witte roest			2		
	zwartevlekkenziekte			2		
<b>knolselder (open lucht)</b>	bladvlekkenziekte	1 l/ha	14 dagen	3		preventief of vanaf het verschijnen van de symptomen, met een interval van 14 dagen
<b>knolvenkel (open lucht en onder bescherming)</b>	bladvlekkenziekte	1 l/ha	14 dagen	3		preventief of vanaf het verschijnen van de symptomen, met een interval van 14 dagen
<b>koolraap (open lucht)</b>	spikkelziekte, alternaria	1 l/ha	14 dagen	2	2	preventief of vanaf het verschijnen van de eerste symptomen, met een interval van 14-21 dagen
	zwartevlekkenziekte			2		
<b>koolrabi (open lucht)</b>	spikkelziekte, alternaria	1 l/ha	14 dagen	2	2	preventief of vanaf het verschijnen van de symptomen, met een interval van 14 dagen
	witte roest			2		
	zwartevlekkenziekte			2		
<b>loofbomen en -heesters (sierbomen)</b>	Cylindrocladium spp.	0,1 l/100 l water		3		interval van 7-14 dagen
	nevenwerking tegen Volutella spp.					

Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ ziekte	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
<b>pastinaak (open lucht)</b>	alternaria	1 l/ha	14 dagen	2	2	preventief of vanaf het verschijnen van de symptomen, met een interval van 14 dagen
	echte meeldauw			2		
<b>peterselie (open lucht)</b>	alternaria	1 l/ha	14 dagen	2	2	preventief of vanaf het verschijnen van de symptomen, met een interval van 14 – 21 dagen
	bladvlekkenziekte			2		
	echte meeldauw			2		
<b>prei (open lucht)</b>	papiervlekkenziekte	1 l/ha	21 dagen	3	3	preventief of vanaf het verschijnen van de symptomen, met een interval van 21 dagen
	purpervlekkenziekte			3		
	roest			3		
<b>raap (open lucht)</b>	spikkelziekte, alternaria	1 l/ha	14 dagen	2	2	preventief of vanaf het verschijnen van de eerste symptomen, met een interval van 14-21 dagen
	zwartevlekkenziekte			2		
<b>rode biet (open lucht)</b>	bladvlekkenziekte/ramularia	1 l/ha	14 dagen	2	2	
	cerospora-bladvlekkenziekte			2		
	echte meeldauw			2		
	roest			2		
<b>schorseneren (open lucht)</b>	echte meeldauw	1 l/ha	9 weken	2	2	preventief of vanaf het verschijnen van de eerste symptomen, met een interval van 14-21 dagen
	witte roest			2		
<b>sierplanten (open lucht en onder bescherming)</b>	alternaria	100 ml/100 l water		2	2	met een interval van 14 dagen, het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Chamaecyparis, Hedera, Viola en Azalea
	ascochyta			2		
	cladosporium			2		
	echte meeldauw			2		
	mycosphaerella			2		
	roest			2		
	schurft			2		
	septoria			2		
	stemphylium			2		
	witte roest			2		

Teelt	Erkend ter bestrijding van	Dosis	Veiligheidstermijn	Max. toepassing/ ziekte	Max. toepassing/ teelt	Toepassing
<b>sluitkool (kabuiskool) (open lucht)</b>	spikkelziekte, alternaria	1 l/ha	21 dagen	2	2	preventief of vanaf het verschijnen van de symptomen, met een interval van 14 dagen
	witte roest			2		
	zwartevlekkenziekte			2		
<b>spruitkool (open lucht)</b>	spikkelziekte, alternaria	1 l/ha	21 dagen	2	2	preventief of vanaf het verschijnen van de symptomen, met een interval van 14 dagen
	witte roest			2		
	zwartevlekkenziekte			2		
<b>witloofwortelteelt</b>	echte meeldauw	1 l/ha	30 dagen	1	1	preventief of vanaf het verschijnen van de symptomen
	roest			1		
	spikkelziekte, alternaria			1		
<b>wortelen (open lucht)</b>	alternaria	1 l/ha	14 dagen	2	2	preventief of vanaf het verschijnen van de symptomen, met een interval van 14 dagen
	echte meeldauw			2		
<b>wortelpeterselie (open lucht)</b>	alternaria	1 l/ha	14 dagen	2	2	preventief of vanaf het verschijnen van de symptomen, met een interval van 14 dagen
	echte meeldauw			2		