

| Teelt | Erkend ter bestrijding van | Dosis | Veiligheidstermijn | Max. toepassing/ onkruid | Max. toepassing/ teelt | Toepassing |
|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---|
| alle teelten | onkruiden | 3 tot 5 l/ha | 10 dagen voor het maaien, het inkuilen of het beweiden | 2 | * | ten laatste 1 dag voor de opkomst of zonder de gewassen te raken |
| aardappelen (open lucht) | aardappelloof | 3-5 l/ha | 4 dagen | 1** | * | |
| boomgard | opslag van fruitboomstronken | 5 l/ha | | 2 | 2* | |
| | onkruiden | | | 2 | | |
| gerst | onkruiden | 2-4 l/ha | 7 dagen | 1 | 1* | volrijpheid (BBCH 89) |
| | doorwas van graangewassen | | | 1 | | |
| haver | onkruiden | 2-4 l/ha | 7 dagen | 1 | 1* | volrijpheid (BBCH 89) |
| | doorwas van graangewassen | | | 1 | | |
| hop | ongewenste scheut- en bladvorming | 1,8 l/ 1120 l water/ha | | | * | in juli, voor de eerste 90-120 cm onderaan de hopstam |
| koolzaad | onkruiden | 3 l/ha | 4 dagen | 1 | * | 80% van de hauwen zijn rijp - volrijpheid : bijna alle hauwen zijn rijp (BBCH 88-89) |
| maïs | onkruiden | 2-4 l/ha | 7 dagen | 1 | 1* | volrijpheid (BBCH 89) |
| | doorwas van graangewassen | | | 1 | | |
| pootaardappelteelt | aardappelloof | 2-5 l/ha | 4 dagen | 1** | * | |
| tijdelijk onbeteelde landbouwgronden | onkruiden | 3 tot 5 l/ha | | 2 | * | ten laatste 1 dag voor de opkomst of zonder de gewassen te raken |
| voedererwten (open lucht) | onkruiden | 3 l/ha | 4 dagen | 1 | * | voor de oogst, rijping volledig (BBCH 89); hooguit 8 dagen voor de oogst |

*maximum 1000 g diquat/ha/12 maanden

**eventueel gefractioneerd toedienen in 2 toepassingen