

# LCG Vlaanderen 2018

HYVIDO  
VOORDEEL  
**+5,3%**  
**+563 kg/ha**

Tabel 3: Landbouwcentrum Granen Vlaanderen. Rassenproeven zesrijzige wintergerst 2018. Korrelopbrengst (in %), rangschikking van de rassen naar dalende gemiddelde productiviteit (\*).

	Ras	LEEM en ZANDLEEM				KUSTPOLDER	Gemiddelde
		West-Vlaanderen	Oost-Vlaanderen	Vlaams-Brabant	Limburg	West-Vlaanderen	
		Poperinge <i>zandleem</i>	Geraardsbergen (Nieuwenhove) <i>leem</i>	Huldenberg <i>lichte leem</i>	Tongeren (Koninksem) <i>lichte leem</i>	Zuienkerke <i>klei (kustpolder)</i>	
<b>Meer dan 5% boven het gemiddelde</b>	Smooth (hybride)	116,3	109,1	108,3	106,1	104,2	108,8
	Jettoo (hybride)	106,3	109,2	111,5	105,4	110,7	108,6
	SU Jule	117,3	104,2	108,6	102,9	-	108,2
	Bazooka (hybride)	103,7	104,7	105,7	106,5	107,3	105,6
	Verity	107,9	104,4	105,7	103,7	104,0	105,1
<b>Tot 5% boven het gemiddelde</b>	Tektoo (hybride)	105,0	99,1	102,2	105,4	109,1	104,2
	Wootan (hybride)	98,3	103,9	102,9	104,1	110,2	103,9
	KWS Tonic	104,1	103,3	105,1	106,2	99,0	103,6
	Hedwig	106,5	107,1	107,4	101,1	94,3	103,3
	Quadriga	99,8	101,2	103,0	100,5	105,0	101,9
	Hook (hybride)	97,3	102,8	95,4	100,4	108,3	100,9
<b>Tot 5% onder het gemiddelde</b>	KWS Meridian	108,7	100,0	98,0	99,8	97,3	100,7
	Veronika	98,8	103,2	98,5	102,6	95,7	99,8
	KWS Keeper	93,9	100,3	96,6	97,9	109,2	99,6
	Monique	101,1	96,2	99,8	99,1	96,2	98,5
	Rafaëla (tolerant dwergvergelingsvirus)	97,7	91,7	93,5	99,0	99,9	96,4
<b>Meer dan 5% onder het gemiddelde</b>	Domino (tolerant dwergvergelingsvirus)	81,5	92,7	92,3	90,0	99,4	91,2
<b>Rassen op een beperkt aantal proefplaatsen beproefd</b>	KWS Orbit	-	-	-	107,4	-	-
	Mercurioo (hybride)	-	-	-	104,8	-	-
	Getuigen (*)	100 (=10.866 kg/ha)	100 (=11.299 kg/ha)	100 (=10.847 kg/ha)	100 (=9.264 kg/ha)	100 (=10.547 kg/ha)	100 (=10.565 kg/ha)
	V.C. (%)	3,26	6,42	4,27	2,73	3,18	

(\*) Korrelopbrengst = relatieve waarden (%) ten aanzien van het gemiddelde van de rassen Domino, Hedwig, KWS Keeper, KWS Tonic, KWS Meridian, Monique, Quadriga, Rafaëla, Veronika en Verity. Ziektebestrijding uitgevoerd op basis van de ziektedruk in de proeven: op alle proefplaatsen werden twee fungicidebehandelingen uitgevoerd (respectievelijk 1<sup>e</sup>-2<sup>e</sup> knoop en laatste blad/baardenstadium)