

Belgique

Published on *Syngenta Belgie* (<https://www.syngenta.be>)

[Accueil](#) > SWITCH

SWITCH



SWITCH

Dernière mise à jour:

04.03.2021

Fongicide

Produits phytosanitaires

Numéro d'homologation:

8893P/B

Composition:

25

fludioxonil

37.5

cyprodinil

Chemical Family:

None given

Formulation:

WG (granulés à disperser dans l'eau)

Product CP: Tabs

- [Registrations](#)
- [Classification and Security](#)

[Registrations](#)

[SWITCH aalbessen \(witte, rode, zwarte\) \(open lucht\) \(Ribes](#)

spp.)

Unpublished

Groseilliers (blancs, rouges, cassis) (plein air) (Ribes spp.)

Admission normale

Anthracnose du groseillier

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.5 kg/ha de haie	3 applications	7 jours	Zone tampon de 10 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

3 applications / 12 mois

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.5 kg/ha de haie	3 applications	7 jours	Zone tampon de 10 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

3 applications / 12 mois

SWITCH Andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (onder bescherming) (Cichorium endivia var latifolia et crispum)

Unpublished

Endives, radicchio rosso, pain de sucre (sous protection) (Cichorium endivia var latifolia et crispum)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	None	None

Maximum total dose:

1 application / culture

Period of use: dans la semaine après plantation

Restriction of Use: dans la semaine après plantation

Sclérotinose

Dose maximale par traitement	Mesures et contrôles des risques	DVP
------------------------------	----------------------------------	-----

0.6 kg/ha	None	None
-----------	------	------

Maximum total dose:

1 application / culture

Period of use: dans la semaine après plantation

Restriction of Use: dans la semaine après plantation

SWITCH Andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (open lucht) (Cichorium endivia var latifolia et crispum)

Unpublished

Endives, radicchio rosso, pain de sucre (plein air) (Cichorium endivia var latifolia et crispum)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Mesures et contrôles des risques	DVP
------------------------------	----------------------------------	-----

0.6 kg/ha	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None
-----------	--	------

Maximum total dose:

1 application / culture

Period of use: dans la semaine après plantation

Restriction of Use: dans la semaine après plantation

Sclérotinose

Dose maximale par traitement	Mesures et contrôles des risques	DVP
------------------------------	----------------------------------	-----

0.6 kg/ha	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None
-----------	--	------

Maximum total dose:

1 application / culture

Period of use: dans la semaine après plantation

Restriction of Use: dans la semaine après plantation

SWITCH Aneth (consommation des feuilles) (plein air) (Anethum graveolens)

Unpublished

Aneth (consommation des feuilles) (plein air) (Anethum graveolens)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

SWITCH Aneth (consommation des feuilles) (sous protection) (Anethum graveolens)

Unpublished

Aneth (consommation des feuilles) (sous protection) (Anethum graveolens)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	None	None

SWITCH Angélique (consommation des racines) (plein air) (Angelica sylvestris)

Unpublished

Angélique (consommation des racines) (plein air) (Angelica sylvestris)
Admission normale

alternariose, brûlure des feuilles de la carotte

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.8 kg/ha	3 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:
3 applications / culture

Sclérotiniose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.8 kg/ha	3 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None
Maximum total dose: 3 applications / culture				

SWITCH Arbres et arbustes ornementaux (non destinés à la consommation) (plein air) (ornamental trees and shrubs)

Unpublished

Arbres et arbustes ornementaux (non destinés à la consommation) (plein air) (ornamental trees and shrubs)

Admission normale

Calonectria (Cylindrocladium)

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Mesures et contrôles des risques	DVP
100 g/100 l	2 applications	Zone tampon de 20 m avec technique classique	None
Maximum total dose: 2 applications / 12 mois			

Moniliose (bouquets floraux et rameaux)

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.067 kg/100 l	2 applications	Zone tampon de 20 m avec technique classique	None
Maximum total dose: 2 applications / 12 mois			
Stade de croissance à l'application: bouton blanc - pleine floraison (BBCH 57-65)			
Bee comment: bouton blanc - pleine floraison (BBCH 57-65)			

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Mesures et contrôles des risques	DVP
100 g/100 l	2 applications	Zone tampon de 20 m avec technique classique	None
Maximum total dose:			

2 applications / 12 mois

SWITCH Arbres et arbustes ornementaux (non destinés à la consommation) (sous protection) (ornamental trees and shrubs)

Unpublished

Arbres et arbustes ornementaux (non destinés à la consommation) (sous protection) (ornamental trees and shrubs)

Admission normale

Calonectria (Cylindrocladium)

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Mesures et contrôles des risques	DVP
100 g/100 l	2 applications	None	None

Maximum total dose:

2 applications / 12 mois

Moniliose (bouquets floraux et rameaux)

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.067 kg/100 l	2 applications	None	None

Maximum total dose:

2 applications / 12 mois

Stade de croissance à l'application: bouton blanc - pleine floraison (BBCH 57-65)

Bee comment: bouton blanc - pleine floraison (BBCH 57-65)

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Mesures et contrôles des risques	DVP
100 g/100 l	2 applications	None	None

Maximum total dose:

2 applications / 12 mois

SWITCH Asperge (onder bescherming) (Asparagus)

officinalis)

Unpublished

Asperge (sous protection) (*Asparagus officinalis*)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	None	None
Period of use:	après la récolte		
Restriction of Use:	après la récolte		

SWITCH Asperge (open lucht) (*Asparagus officinalis*)

Unpublished

Asperge (plein air) (*Asparagus officinalis*)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None
Period of use:	après la récolte		
Restriction of Use:	après la récolte		

SWITCH Aubergine/eierplant en pepino (onder bescherming) (*Solanum melongena* - *Solanum muricatum*)

Unpublished

Aubergine et pépinos (sous protection) (*Solanum melongena* - *Solanum muricatum*)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.457 kg/ha de haie	3 applications	3 jours	None	None
Period of use:	préventif			
Restriction of Use:	préventif			

SWITCH Augurk (onder bescherming) (Cucumis sativus)

Unpublished

Cornichon (sous protection) (Cucumis sativus)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.457 kg/ha pour une culture horizontale ou 0,457 kg/ha de haie pour une culture verticale	3 applications	3 jours	None	None
Period of use:	préventif			
Restriction of Use:	préventif			

SWITCH Basilic (consommation des feuilles) (plein air) (Ocimum basilicum)

Unpublished

Basilic (consommation des feuilles) (plein air) (Ocimum basilicum)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

SWITCH Basilic (consommation des feuilles) (sous protection) (Ocimum basilicum)

Unpublished

Basilic (consommation des feuilles) (sous protection) (Ocimum basilicum)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).	None

SWITCH Basilic (consommation des feuilles) et fleurs comestibles (consommation des fleurs) (plein air) (Ocimum basilicum and edible flowers)

Unpublished

Basilic (consommation des feuilles) et fleurs comestibles (consommation des fleurs) (plein air) (Ocimum basilicum and edible flowers)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

SWITCH Basilic (consommation des feuilles) et fleurs comestibles (consommation des fleurs)(sous protection) (Ocimum basilicum and edible flowers)

Unpublished

Basilic (consommation des feuilles) et fleurs comestibles (consommation des fleurs)(sous protection) (Ocimum basilicum and edible flowers)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	None	None

SWITCH Basilicum (consomptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming) (Ocimum basilicum)

Unpublished

Basilic (consommation des feuilles et/ou tiges) (sous protection) (Ocimum basilicum)
Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques

DVP

SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).

None

SWITCH Basilicum (consomptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Ocimum basilicum)

Unpublished

Basilic (consommation des feuilles et/ou tiges) (plein air) (Ocimum basilicum)
Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques

DVP

SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).

None

SWITCH Bieslook (consomptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Allium schoenoprasum)

Unpublished

Ciboulette (consommation des feuilles et/ou tiges) (plein air) (Allium schoenoprasum)
Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques

DVP

SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).

None

SWITCH Blauwe / rode bosbessen (open lucht) (Vaccinium myrtillus & V. corymbosum)

Unpublished

Myrtilles / airelles rouges (plein air) (Vaccinium myrtillus & V. corymbosum)

Admission normale

Anthracnose du groseillier

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.5 kg/ha de haie	3 applications	7 jours	Zone tampon de 10 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

3 applications / 12 mois

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.5 kg/ha de haie	3 applications	7 jours	Zone tampon de 10 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

3 applications / 12 mois

SWITCH Bourrache commune (consommation des fleurs) (plein air) (Borago officinalis)

Unpublished

Bourrache commune (consommation des fleurs) (plein air) (Borago officinalis)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

SWITCH bourrache commune (consommation des fleurs) (sous protection) (Borago officinalis)

Unpublished

bourrache commune (consommation des fleurs) (sous protection) (Borago officinalis)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	None	None

SWITCH Braamstruiken (onder bescherming) (Rubus fruticosus)

Unpublished

Ronces (mûres) (sous protection) (Rubus fruticosus)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.5 kg/ha de haie	3 applications	7 jours	None	None

Stade de croissance à l'application: les fruits ont atteint environ 80% de leur taille finale (BBCH 78)

Bee comment: les fruits ont atteint environ 80% de leur taille finale (BBCH 78)

SWITCH Braamstruiken (open lucht) (Rubus fruticosus)

Unpublished

Ronces (mûres) (plein air) (Rubus fruticosus)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------------	-----

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.5 kg/ha de haie	3 applications	7 jours	Zone tampon de 10 m avec technique classique	None
Stade de croissance à l'application:	les fruits ont atteint environ 80% de leur taille finale (BBCH 78)			
Bee comment:	les fruits ont atteint environ 80% de leur taille finale (BBCH 78)			

[SWITCH Carvi \(consommation des feuilles\) \(plein air\) \(Carum carvi\)](#)

Unpublished

Carvi (consommation des feuilles) (plein air) (Carum carvi)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

[SWITCH Carvi \(consommation des feuilles\) \(sous protection\) \(Carum carvi\)](#)

Unpublished

Carvi (consommation des feuilles) (sous protection) (Carum carvi)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	None	None

[SWITCH Céleri à couper \(consommation des feuilles\) \(plein](#)

air) (Apium graveolens var. secalinum)

Unpublished

Céleri à couper (consommation des feuilles) (plein air) (Apium graveolens var. secalinum)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

SWITCH Céleri à couper (consommation des feuilles) (sous protection) (Apium graveolens var. secalinum)

Unpublished

Céleri à couper (consommation des feuilles) (sous protection) (Apium graveolens var. secalinum)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	None	None

SWITCH Cerfeuil (consommation des feuilles) (plein air) (Anthriscus cerefolium)

Unpublished

Cerfeuil (consommation des feuilles) (plein air) (Anthriscus cerefolium)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

SWITCH Cerfeuil (consommation des feuilles) (sous protection) (Anthriscus cerefolium)

Unpublished

Cerfeuil (consommation des feuilles) (sous protection) (Anthriscus cerefolium)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	None	None

SWITCH Cerisiers et griottiers (plein air) (Prunus avium et P. cerasus)

Unpublished

Cerisiers et griottiers (plein air) (Prunus avium et P. cerasus)

Admission normale

Moniliose (bouquets floraux et rameaux)

Dose maximale par traitement	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.67 kg/ha de haie (basses tiges)	Zone tampon de 20 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / 12 mois

Stade de croissance bouton blanc - pleine floraison (BBCH 57-65)

à l'application:

Bee comment: bouton blanc - pleine floraison (BBCH 57-65)

Moniliose (fruits)

Dose maximale par traitement	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.067 kg/100 l (hautes tiges)	7 jours	Zone tampon de 20 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / 12 mois

Stade de croissance début de la coloration des fruits - maturation complète des fruits (BBCH 81-89)

à l'application:

Bee comment: début de la coloration des fruits - maturation complète des fruits (BBCH 81-89)

SWITCH Ciboulette (consommation des feuilles et/ou tiges) (sous protection) (Allium schoenoprasum)

Unpublished

Ciboulette (consommation des feuilles et/ou tiges) (sous protection) (Allium schoenoprasum)
Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques

DVP

SPE3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).

None

SWITCH Ciboulette (consommation des feuilles) (plein air) (Allium schoenoprasum)

Unpublished

Ciboulette (consommation des feuilles) (plein air) (Allium schoenoprasum)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

SWITCH Ciboulette (consommation des feuilles) (sous protection) (Allium schoenoprasum)

Unpublished

Ciboulette (consommation des feuilles) (sous protection) (Allium schoenoprasum)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	None	None

SWITCH Citroenmelisse (consomptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming) (Melissa officinalis)

Unpublished

Mélisse (consommation des feuilles et/ou tiges) (sous protection) (Melissa officinalis)
Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques

DVP

SPE3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).

None

SWITCH Citroenmelisse (consomptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Melissa officinalis)

Unpublished

Mélisse (consommation des feuilles et/ou tiges) (plein air) (Melissa officinalis)
Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques

DVP

SPE3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).

None

SWITCH Coriandre (consommation des feuilles et/ou tiges)(sous protection) (Coriandrum sativum)

Unpublished

Coriandre (consommation des feuilles et/ou tiges)(sous protection) (Coriandrum sativum)
Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques

DVP

SPE3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).

None

SWITCH Coriandre (consommation des feuilles) (plein air) (Coriandrum sativum)

Unpublished

Coriandre (consommation des feuilles) (plein air) (Coriandrum sativum)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

SWITCH Coriandre (consommation des feuilles) (sous protection) (Coriandrum sativum)

Unpublished

Coriandre (consommation des feuilles) (sous protection) (Coriandrum sativum)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	None	None

SWITCH Courgette/patisson (onder bescherming) (Cucurbita pepo)

Unpublished

Courgette/patisson (sous protection) (Cucurbita pepo)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.457 kg/ha pour une culture horizontale ou 0,457 kg/ha de haie pour une culture verticale	3 applications	3 jours	None	None
Period of use:	préventif			
Restriction of Use:	préventif			

[SWITCH cresson alénois et autres jeunes pousses \(sous protection\) \(Lepidium sativum\)](#)

Unpublished

cresson alénois et autres jeunes pousses (sous protection) (Lepidium sativum)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	3 applications	7 jours	None	None

[SWITCH Dille \(consumptie bladeren en/of stengels\) \(onder bescherming\) \(Anethum graveolens\)](#)

Unpublished

Aneth (consommation des feuilles et/ou tiges) (sous protection) (Anethum graveolens)
Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques	DVP
SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).	None

[SWITCH Dille \(consumptie bladeren en/of stengels\) \(open lucht\) \(Anethum graveolens\)](#)

Unpublished

Aneth (consommation des feuilles et/ou tiges) (plein air) (Anethum graveolens)
Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques

DVP

SPE3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).

None

[SWITCH Dragon \(consumptie bladeren en/of stengels\) \(onder bescherming\) \(Artemisia dracunculus\)](#)

Unpublished

Estragon (consommation des feuilles et/ou tiges) (sous protection) (Artemisia dracunculus)
Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques

DVP

SPE3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).

None

[SWITCH Dragon \(consumptie bladeren en/of stengels\) \(open lucht\) \(Artemisa dracunculus\)](#)

Unpublished

Estragon (consommation des feuilles et/ou tiges) (plein air) (Artemisia dracunculus)
Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques

DVP

SPE3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).

None

[SWITCH Drooggeogste erwten \(zonder peul\) \(open lucht\) \(Pisum sativum\)](#)

Unpublished

Pois récoltés secs (sans cosse) (plein air) (Pisum sativum)
Admission normale

Anthracnose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	14 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Stade de croissance pendant la floraison (BBCH 60-69)

à l'application:

Bee comment: pendant la floraison (BBCH 60-69)

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	14 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Stade de croissance pendant la floraison (BBCH 60-69)

à l'application:

Bee comment: pendant la floraison (BBCH 60-69)

Sclérotiniose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	14 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Stade de croissance pendant la floraison (BBCH 60-69)

à l'application:

Bee comment: pendant la floraison (BBCH 60-69)

SWITCH Échalote (plein air) (Allium cepa Aggregatum types)

Unpublished

Échalote (plein air) (Allium cepa Aggregatum types)

Admission normale

Sclérotiniose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	3 applications	21 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None
Stade de croissance à l'application:	A partir du stade: "la base des feuilles commence à grossir ou à s'allonger" (BBCH > 41)			
Bee comment:	A partir du stade: "la base des feuilles commence à grossir ou à s'allonger" (BBCH > 41)			

SWITCH Estragon (consommation des feuilles) (plein air) (Artemisia dracunculus)

Unpublished

Estragon (consommation des feuilles) (plein air) (Artemisia dracunculus)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

SWITCH Estragon (consommation des feuilles) (sous protection) (Artemisia dracunculus)

Unpublished

Estragon (consommation des feuilles) (sous protection) (Artemisia dracunculus)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	None	None

SWITCH Fèves et féveroles (récoltées fraîches, sans cosse) (plein air) (Vicia faba)

Unpublished

Fèves et féveroles (récoltées fraîches, sans cosse) (plein air) (Vicia faba)

Admission normale

Anthracnose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	14 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Stade de croissance à l'application: pendant la floraison (BBCH 60-69)

Bee comment: pendant la floraison (BBCH 60-69)

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	14 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Stade de croissance à l'application: pendant la floraison (BBCH 60-69)

Bee comment: pendant la floraison (BBCH 60-69)

Sclérotiniose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	14 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Stade de croissance à l'application: pendant la floraison (BBCH 60-69)

Bee comment:

Bee comment: pendant la floraison (BBCH 60-69)

[SWITCH Fraisiers \(champ de production\) \(plein air\)](#) [\(Fragaria x ananassa\)](#)

Unpublished

Fraisiers (champ de production) (plein air) (Fragaria x ananassa)

Admission normale

Anthracnose du fraisier

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	3 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	3 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

[SWITCH Fraisiers \(champ de production\) \(sous protection\)](#) [\(Fragaria x ananassa\)](#)

Unpublished

Fraisiers (champ de production) (sous protection) (Fragaria x ananassa)

Admission normale

Anthracnose du fraisier

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	1 jour	None	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	1 jour	None	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

SWITCH Fraisiers (champ de sélection et de multiplication) (plein air) (Fragaria x ananassa)

Unpublished

Fraisiers (champ de sélection et de multiplication) (plein air) (Fragaria x ananassa)

Admission normale

Anthraxose du fraisier

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

SWITCH Fraisiers (champ de sélection et de multiplication) (sous protection) (Fragaria x ananassa)

Unpublished

Fraisiers (champ de sélection et de multiplication) (sous protection) (Fragaria x ananassa)

Admission normale

Anthracnose du fraisier

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	None	None

Maximum total dose:
2 applications / culture

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	None	None

Maximum total dose:
2 applications / culture

SWITCH Framboisiers (sous protection) (Rubus idaeus)

Unpublished

Framboisiers (sous protection) (Rubus idaeus)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.5 kg/ha de haie	3 applications	7 jours	None	None

Stade de croissance à l'application: les fruits ont atteint environ 80% de leur taille finale (BBCH 78)

Bee comment: les fruits ont atteint environ 80% de leur taille finale (BBCH 78)

SWITCH Frambozenstruiken (open lucht) (Rubus idaeus)

Unpublished

Framboisiers (plein air) (Rubus idaeus)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.5 kg/ha de haie	3 applications	7 jours	Zone tampon de 10 m avec technique classique	None
Stade de croissance à l'application:	les fruits ont atteint environ 80% de leur taille finale (BBCH 78)			
Bee comment:	les fruits ont atteint environ 80% de leur taille finale (BBCH 78)			

SWITCH Groengeogste erwten (met peul) (open lucht) (Pisum sativum)

Unpublished

Pois verts (avec cosse) (mange-tout) (plein air) (Pisum sativum)

Admission normale

Anthracnose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	14 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Stade de croissance à l'application: pendant la floraison (BBCH 60-69)

Bee comment: pendant la floraison (BBCH 60-69)

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	14 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Stade de croissance à l'application: pendant la floraison (BBCH 60-69)

Bee comment: pendant la floraison (BBCH 60-69)

Sclérotiniose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	14 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Stade de croissance pendant la floraison (BBCH 60-69)

à l'application:

Bee comment: pendant la floraison (BBCH 60-69)

SWITCH Groengeoogste erwten (zonder peul) (open lucht) (Pisum sativum)

Unpublished

Petit pois (sans cosse) (plein air) (Pisum sativum)

Admission normale

Anthraxose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	14 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Stade de croissance pendant la floraison (BBCH 60-69)

à l'application:

Bee comment: pendant la floraison (BBCH 60-69)

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	14 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Stade de croissance pendant la floraison (BBCH 60-69)

à l'application:

Bee comment: pendant la floraison (BBCH 60-69)

Sclérotiniose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	14 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Stade de croissance pendant la floraison (BBCH 60-69)

à l'application:

Bee comment: pendant la floraison (BBCH 60-69)

SWITCH haricot vert (recolté frais, avec cosse)(plein air) (Phaseolus vulgaris)

Unpublished

haricot vert (recolté frais, avec cosse)(plein air) (Phaseolus vulgaris)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	14 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Stade de croissance pendant la floraison (BBCH 60-69)

à l'application:

Bee comment: pendant la floraison (BBCH 60-69)

Sclérotiniose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	14 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Stade de croissance pendant la floraison (BBCH 60-69)

à l'application:

Bee comment: pendant la floraison (BBCH 60-69)

[SWITCH Karwij \(consumptie bladeren en/of stengels\) \(onder bescherming\) \(Carum carvi\)](#)

Unpublished

Carvi (consommation des feuilles et/ou tiges) (sous protection) (Carum carvi)

Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques

DVP

SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).

None

[SWITCH Karwij \(consumptie bladeren en/of stengels\) \(open lucht\) \(Carum carvi\)](#)

Unpublished

Carvi (consommation des feuilles et/ou tiges) (plein air) (Carum carvi)

Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques

DVP

SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).

None

[SWITCH Kervel \(consumptie bladeren en/of stengels\) \(onder bescherming\) \(Anthriscus cerefolium\)](#)

Unpublished

Cerfeuil (consommation des feuilles et/ou tiges) (sous protection) (Anthriscus cerefolium)

Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques**DVP**

SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).

None

SWITCH Kervel (consommation bladeren en/of stengels) (open lucht) (Anthriscus cerefolium)

Unpublished

Cerfeuil (consommation des feuilles et/ou tiges) (plein air) (Anthriscus cerefolium)

Admission normale

Pourriture grise**Mesures et contrôles des risques****DVP**

SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).

None

SWITCH Kiwibes (open lucht) (Actinidia arguta)

Unpublished

Kiwai (kiwi de Sibérie) (plein air) (Actinidia arguta)

Admission normale

Pourriture grise**Dose maximale par traitement****Pre Harvest Interval (PHI)****Mesures et contrôles des risques****DVP**

0.83 kg/ha de haie

21 jours

Zone tampon de 10 m avec technique classique

None

Stade de croissance à l'application: fin de la floraison - véraison (BBCH 69-85)**Bee comment:** fin de la floraison - véraison (BBCH 69-85)

SWITCH Knoflook (open lucht) (Allium sativum)

Unpublished

Ail (plein air) (Allium sativum)

Admission normale

Sclerotiniose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	3 applications	21 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None
Stade de croissance à l'application:	A partir du stade: "la base des feuilles commence à grossir ou à s'allonger" (BBCH > 41)			
Bee comment:	A partir du stade: "la base des feuilles commence à grossir ou à s'allonger" (BBCH > 41)			

[SWITCH Knolselder \(open lucht\) \(Apium graveolens var. rapaceum\)](#)

Unpublished

Céleri-raves (plein air) (Apium graveolens var. rapaceum)
Admission normale

Sclérotiniose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.8 kg/ha	2 applications	14 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

[SWITCH Knolvenkel \(open lucht\) \(Foeniculum vulgare\)](#)

Unpublished

Fenouil (plein air) (Foeniculum vulgare)
Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques	DVP
None	None

Sclérotiniose

Mesures et contrôles des risques	DVP
None	None

SWITCH Komkommer (onder bescherming) (Cucumis sativus)

Unpublished

Concombre (sous protection) (Cucumis sativus)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.457 kg/ha de haie	3 applications	3 jours	None	None
Period of use:	préventif			
Restriction of Use:	préventif			

SWITCH Koriander (consomptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Coriandrum sativum)

Unpublished

Coriandre (consommation des feuilles et/ou tiges) (plein air) (Coriandrum sativum)

Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques	DVP
SPE3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).	None

SWITCH Laitues (plein air) (Lactuca sp.)

Unpublished

Laitues (plein air) (Lactuca sp.)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None
Maximum total dose:		
1 application / culture		
Period of use:	durant la semaine qui suit la plantation	

Restriction of Use: durant la semaine qui suit la plantation

Sclérotiniose

Dose maximale par traitement	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None
Maximum total dose: 1 application / culture		
Period of use:	durant la semaine qui suit la plantation	
Restriction of Use:	durant la semaine qui suit la plantation	

SWITCH Laitues (sous protection) (Lactuca sp.)

Unpublished

Laitues (sous protection) (Lactuca sp.)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	None	None
Maximum total dose: 1 application / culture		
Period of use:	durant la semaine qui suit la plantation	
Restriction of Use:	durant la semaine qui suit la plantation	

Sclérotiniose

Dose maximale par traitement	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	None	None
Maximum total dose: 1 application / culture		
Period of use:	durant la semaine qui suit la plantation	
Restriction of Use:	durant la semaine qui suit la plantation	

SWITCH Laurier (consommation des feuilles) (plein air) (Laurus nobilis)

Unpublished

Laurier (consommation des feuilles) (plein air) (Laurus nobilis)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

SWITCH Laurier (consommation des feuilles) (sous protection) (Laurus nobilis)

Unpublished

Laurier (consommation des feuilles) (sous protection) (Laurus nobilis)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	None	None

SWITCH Laurier (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming) (Laurus nobilis)

Unpublished

Laurier (consommation des feuilles et/ou tiges) (sous protection) (Laurus nobilis)
Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques	DVP
SPE3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).	None

SWITCH Laurier (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Laurus nobilis)

Unpublished

Laurier (consommation des feuilles et/ou tiges) (plein air) (Laurus nobilis)

Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques

DVP

SPE3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).

None

SWITCH Lavas, maggiplant (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming) (Levisticum officinale)

Unpublished

Livèche (consommation des feuilles et/ou tiges) (sous protection) (Levisticum officinale)

Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques

DVP

SPE3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).

None

SWITCH Lavas, maggiplant (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Levisticum officinale)

Unpublished

Livèche (consommation des feuilles et/ou tiges) (plein air) (Levisticum officinale)

Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques

DVP

SPE3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).

None

SWITCH Livèche (consommation des feuilles) (plein air) (Levisticum officinale)

Unpublished

Livèche (consommation des feuilles) (plein air) (Levisticum officinale)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

SWITCH Livèche (consommation des feuilles) (sous protection) (Levisticum officinale)

Unpublished

Livèche (consommation des feuilles) (sous protection) (Levisticum officinale)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	None	None

SWITCH Livèche (consommation des racines) (plein air) (Levisticum officinale)

Unpublished

Livèche (consommation des racines) (plein air) (Levisticum officinale)
Admission normale

alternariose, brûlure des feuilles de la carotte

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.8 kg/ha	3 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:
3 applications / culture

Rhizoctone

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.8 kg/ha	3 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:
3 applications / culture

Sclérotiniose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.8 kg/ha	3 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:
3 applications / culture

[SWITCH Marjolein/oregano \(consomptie bladeren en/of stengels\) \(onder bescherming\) \(Origanum spp.\)](#)

Unpublished

Origan/marjolaine (consommation des feuilles et/ou tiges) (sous protection) (Origanum spp.)
Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques	DVP
SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).	None

[SWITCH Mélisse \(consommation des feuilles\) \(plein air\) \(Melissa officinalis\)](#)

Unpublished

Mélisse (consommation des feuilles) (plein air) (Melissa officinalis)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

SWITCH Mélisse (consommation des feuilles) (sous protection) (Melissa officinalis)

Unpublished

Mélisse (consommation des feuilles) (sous protection) (Melissa officinalis)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	None	None

SWITCH Meloen (onder bescherming) (Cucumis melo)

Unpublished

Melon (sous protection) (Cucumis melo)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha (culture horizontale) ou 1 kg/ha de haie (culture verticale)	2 applications	3 jours	None	None

Maximum total dose:
2 applications / culture

Sclérotiniose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha (culture horizontale) ou 1 kg/ha de haie (culture verticale)	2 applications	3 jours	None	None
Maximum total dose: 2 applications / culture				

[SWITCH Menthe \(consommation des feuilles\) \(plein air\) \(Mentha sp.\)](#)

Unpublished

Menthe (consommation des feuilles) (plein air) (Mentha sp.)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

[SWITCH Menthe \(consommation des feuilles\) \(sous protection\) \(Mentha spp.\)](#)

Unpublished

Menthe (consommation des feuilles) (sous protection) (Mentha spp.)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	None	None

[SWITCH Moutarde brune \(consommation des feuilles\) \(sous](#)

protection) (Brassica juncea)

Unpublished

Moutarde brune (consommation des feuilles) (sous protection) (Brassica juncea)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	3 applications	7 jours	None	None

SWITCH Munt (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming) (Mentha sp.)

Unpublished

Menthe (consommation des feuilles et/ou tiges) (sous protection) (Mentha sp.)
Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques	DVP
SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).	None

SWITCH Munt (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Mentha sp.)

Unpublished

Menthe (consommation des feuilles et/ou tiges) (plein air) (Mentha sp.)
Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques	DVP
SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).	None

SWITCH Oignons (récolté sec) (plein air) (Allium cepa)

Unpublished

Oignons (récolté sec) (plein air) (*Allium cepa*)
Admission normale

Sclérotiniose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	3 applications	14 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Stade de croissance à l'application: A partir du stade: "la base des feuilles commence à grossir ou à s'allonger" (BBCH > 41)

Bee comment: A partir du stade: "la base des feuilles commence à grossir ou à s'allonger" (BBCH > 41)

SWITCH Oignons de printemps (plein air) (*Allium fistulosum/ A. cepa*)

Unpublished

Oignons de printemps (plein air) (*Allium fistulosum/ A. cepa*)
Admission normale

Sclérotiniose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	14 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:
3 applications/ha / 12 mois

SWITCH Origan/marjolaine (consommation des feuilles et/ou tiges)(plein air) (*Oreganum spp.*)

Unpublished

Origan/marjolaine (consommation des feuilles et/ou tiges)(plein air) (*Oreganum spp.*)
Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques**DVP**

SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).

None

SWITCH Origan/marjolaine (consommation des feuilles) (sous protection) (Oreganum spp.)**Unpublished**

Origan/marjolaine (consommation des feuilles) (sous protection) (Oreganum spp.)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	None	None

SWITCH Origan/marjolaine (consommation des feuilles)(plein air) (Oreganum spp.)**Unpublished**

Origan/marjolaine (consommation des feuilles)(plein air) (Oreganum spp.)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

SWITCH Paprika/spaanse peper (onder bescherming) (Capsicum annum)**Unpublished**

Poivron/piment (sous protection) (Capsicum annum)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.457 kg/ha de haie	3 applications	3 jours	None	None
Period of use:	préventif			
Restriction of Use:	préventif			

SWITCH Pastinaak (open lucht) (Pastinaca sativa)

Unpublished

Panais (plein air) (Pastinaca sativa)

Admission normale

alternariose, brûlure des feuilles de la carotte

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.8 kg/ha	3 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

3 applications / culture

Sclérotiniose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.8 kg/ha	3 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

3 applications / culture

SWITCH Perenbomen (open lucht) (Pyrus communis)

Unpublished

poiriers (plein air) (Pyrus communis)

Admission normale

Pourriture amère

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.5 kg/ha de haie	2 applications	3 jours	Zone tampon de 20 m avec technique classique	None
Maximum total dose: 2 applications / 12 mois				
Period of use: préventivement, dès 6 semaines avant la récolte				
Restriction of Use: préventivement, dès 6 semaines avant la récolte				

Pourriture bleue

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.5 kg/ha de haie	2 applications	3 jours	Zone tampon de 20 m avec technique classique	None
Maximum total dose: 2 applications / 12 mois				
Period of use: préventivement, dès 6 semaines avant la récolte				
Restriction of Use: préventivement, dès 6 semaines avant la récolte				

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.5 kg/ha de haie	2 applications	3 jours	Zone tampon de 20 m avec technique classique	None
Maximum total dose: 2 applications / 12 mois				
Period of use: dès 6 semaines avant la récolte, préventivement				
Restriction of Use: dès 6 semaines avant la récolte, préventivement				

Stemphyliose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.5 kg/ha de haie	2 applications	3 jours	Zone tampon de 20 m avec technique classique	None
Maximum total dose: 2 applications / 12 mois				

Stade de croissance à l'application: la floraison s'achève: la plupart des pétales sont tombés - maturation complète des fruits (BBCH 67-89)
Period of use: préventivement
Restriction of Use: préventivement
Bee comment: la floraison s'achève: la plupart des pétales sont tombés - maturation complète des fruits (BBCH 67-89)

[SWITCH Persil \(consommation des feuilles\) \(plein air\) \(Petroselinum crispum\)](#)

Unpublished

Persil (consommation des feuilles) (plein air) (Petroselinum crispum)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

[SWITCH Persil \(consommation des feuilles\) \(sous protection\) \(Petroselinum crispum\)](#)

Unpublished

Persil (consommation des feuilles) (sous protection) (Petroselinum crispum)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	None	None

[SWITCH Persil à grosses racines et cerfeuil tubéreux \(consommation de la racine\) \(plein air\) \(Petroselinum crispum var. tuberosum & Chaerophyllum bulbosum\)](#)

Unpublished

Persil à grosses racines et cerfeuil tubéreux (consommation de la racine) (plein air) (Petroselinum crispum var. tuberosum & Chaerophyllum bulbosum)

Admission normale

alternariose, brûlure des feuilles de la carotte

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.8 kg/ha	3 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

3 applications / culture

Rhizoctone

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.8 kg/ha	3 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

3 applications / culture

Sclérotiniose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.8 kg/ha	3 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

3 applications / culture

SWITCH Peterselie (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming) (Petroselinum crispum)

Unpublished

Persil (consommation des feuilles et/ou tiges) (sous protection) (Petroselinum crispum)

Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques**DVP**

SPE3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).

None

SWITCH Peterselie (open lucht) (consumptie bladeren en/of stengels) (Petroselinum crispum)

Unpublished

Persil (consommation des feuilles et/ou tiges) (plein air) (Petroselinum crispum)

Admission normale

Pourriture grise**Mesures et contrôles des risques****DVP**

SPE3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).

None

SWITCH Plantes ornementales non ligneuses (non destinées à la consommation) (sous protection) (ornamental herbaceous plants)

Unpublished

Plantes ornementales non ligneuses (non destinées à la consommation) (sous protection) (ornamental herbaceous plants)

Admission normale

Calonectria (Cylindrocladium)**Dose maximale par traitement****Maximum number of applications****Mesures et contrôles des risques****DVP**

100 g/100 l

2 applications

None

None

Maximum total dose:

2 applications / 12 mois

Pourriture grise**Dose maximale par traitement****Maximum number of applications****Mesures et contrôles des risques****DVP**

100 g/100 l

2 applications

None

None

Maximum total dose:

2 applications / 12 mois

SWITCH Plantes ornementales non ligneuses (non destinées à la consommation)(plein air) (ornamental herbaceous plants)

Unpublished

Plantes ornementales non ligneuses (non destinées à la consommation)(plein air) (ornamental herbaceous plants)

Admission normale

Calonectria (Cylindrocladium)

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Mesures et contrôles des risques	DVP
100 g/100 l	2 applications	Zone tampon de 10 m avec technique classique	None

Maximum total dose:
2 applications / 12 mois

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Mesures et contrôles des risques	DVP
100 g/100 l	2 applications	Zone tampon de 10 m avec technique classique	None

Maximum total dose:
2 applications / 12 mois

SWITCH Pommiers (plein air) (Malus domestica)

Unpublished

Pommiers (plein air) (Malus domestica)

Admission normale

Pourriture amère

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.5 kg/ha de haie	2 applications	3 jours	Zone tampon de 20 m avec technique classique	None

Maximum total dose:
2 applications / 12 mois

Period of use: dès 6 semaines avant la récolte, préventivement

Restriction of Use: dès 6 semaines avant la récolte, préventivement

Pourriture bleue

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.5 kg/ha de haie	2 applications	3 jours	Zone tampon de 20 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / 12 mois

Period of use: préventivement, dès 6 semaines avant la récolte

Restriction of Use: préventivement, dès 6 semaines avant la récolte

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.5 kg/ha de haie	2 applications	3 jours	Zone tampon de 20 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / 12 mois

Period of use: dès 6 semaines avant la récolte, préventivement

Restriction of Use: préventivement, dès 6 semaines avant la récolte

SWITCH Pompoen (onder bescherming) (Cucurbita maxima)

Unpublished

Potiron (sous protection) (Cucurbita maxima)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	3 jours	SPE3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).	None

SWITCH Pompoen (open lucht) (Cucurbita maxima)

Unpublished

Potiron (plein air) (Cucurbita maxima)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	3 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

SWITCH Potiron (plein air) (Cucurbita maxima & C. moschata)

Unpublished

Potiron (plein air) (Cucurbita maxima & C. moschata)

Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques	DVP
None	None

SWITCH Potiron (sous protection) (Cucurbita maxima & C. moschata)

Unpublished

Potiron (sous protection) (Cucurbita maxima & C. moschata)

Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques	DVP
None	None

SWITCH pruniers (plein air) (Prunus domestica subsp.

domestica)

Unpublished

pruniers (plein air) (*Prunus domestica* subsp. *domestica*)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.67 kg/ha de haie	2 applications	7 jours	Zone tampon de 20 m avec technique classique	None

SWITCH Racines de witloof (conservation, post-récolte) (Cichorium intybus var. foliosum)

Unpublished

Racines de witloof (conservation, post-récolte) (*Cichorium intybus* var. *foliosum*)

Admission normale

Sclérotinose

Mesures et contrôles des risques	DVP
None	None

SWITCH Radijs (onder bescherming) (Raphanus sativus var. radicula)

Unpublished

Radis (sous protection) (*Raphanus sativus* var. *radicula*)

Admission normale

alternariose, brûlure des feuilles de la carotte

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	14 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Stade de croissance à l'application: A partir du stade: "racines, tiges ou tubercules commencent à se développer (diamètre > 0.5 cm)" (BBCH > 41)
Bee comment: A partir du stade: "racines, tiges ou tubercules commencent à se développer (diamètre > 0.5 cm)" (BBCH > 41)

Sclérotiniose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	14 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Stade de croissance à l'application: A partir du stade: "racines, tiges ou tubercules commencent à se développer (diamètre > 0.5 cm)" (BBCH > 41)

Bee comment: A partir du stade: "racines, tiges ou tubercules commencent à se développer (diamètre > 0.5 cm)" (BBCH > 41)

SWITCH Raifort (plein air) (Armoracia rusticana)

Unpublished

Raifort (plein air) (Armoracia rusticana)

Admission normale

alternariose, brûlure des feuilles de la carotte

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.8 kg/ha	2 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Stade de croissance à l'application: A partir du stade: "racines, tiges ou tubercules commencent à se développer (diamètre > 0.5 cm)" (>BBCH 41)

Bee comment: A partir du stade: "racines, tiges ou tubercules commencent à se développer (diamètre > 0.5 cm)" (>BBCH 41)

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.8 kg/ha	2 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Stade de croissance à l'application: A partir du stade: "racines, tiges ou tubercules commencent à se développer (diamètre > 0.5 cm)" (>BBCH 41)

Bee comment: A partir du stade: "racines, tiges ou tubercules commencent à se développer (diamètre > 0.5 cm)" (>BBCH 41)

Sclérotinose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.8 kg/ha	2 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Stade de croissance à l'application: A partir du stade: "racines, tiges ou tubercules commencent à se développer (diamètre > 0.5 cm)" (>BBCH 41)

Bee comment: A partir du stade: "racines, tiges ou tubercules commencent à se développer (diamètre > 0.5 cm)" (>BBCH 41)

SWITCH Rode amsoi (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming) (Brassica juncea)

Unpublished

Moutarde brune (consommation des feuilles et/ou tiges) (sous protection) (Brassica juncea)

Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques	DVP
SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).	None

SWITCH Romarin (consommation des feuilles) (plein air)

(Rosmarinus officinalis)

Unpublished

Romarin (consommation des feuilles) (plein air) (Rosmarinus officinalis)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

SWITCH Romarin (consommation des feuilles) (sous protection) (Rosmarinus officinalis)

Unpublished

Romarin (consommation des feuilles) (sous protection) (Rosmarinus officinalis)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	None	None

SWITCH Rozemarijn (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming) (Rosmarinus officinalis)

Unpublished

Romarin (consommation des feuilles et/ou tiges) (sous protection) (Rosmarinus officinalis)
Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques	DVP
SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).	None

SWITCH Rozemarijn (consomptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Rosamarinus officinalis)

Unpublished

Romarin (consommation des feuilles et/ou tiges) (plein air) (Rosamarinus officinalis)

Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques

DVP

SPE3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).

None

SWITCH Rucola (onder bescherming) (Eruca sativa/Diplotaxis spp.)

Unpublished

Roquette (sous protection) (Eruca sativa/Diplotaxis spp.)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	3 applications	21 jours	None	None

SWITCH Rucola (open lucht) (Eruca sativa/Diplotaxis spp.)

Unpublished

Roquette (plein air) (Eruca sativa/Diplotaxis spp.)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	3 applications	21 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

SWITCH Salie (consomptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Salvia officinalis)

Unpublished

Sauge officinale (consommation des feuilles et/ou tiges) (plein air) (Salvia officinalis)

Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques

DVP

SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).

None

SWITCH sauge officinale (consommation des feuilles et/ou tiges) (sous protection) (Salvia officinalis)

Unpublished

sauge officinale (consommation des feuilles et/ou tiges) (sous protection) (Salvia officinalis)

Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques

DVP

SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).

None

SWITCH Sauge officinale (consommation des feuilles) (plein air) (Salvia officinalis)

Unpublished

Sauge officinale (consommation des feuilles) (plein air) (Salvia officinalis)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement

Maximum number of applications

Pre Harvest Interval (PHI)

Mesures et contrôles des risques

DVP

0.6 kg/ha

2 applications

7 jours

Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

None

SWITCH Sauge officinale (consommation des feuilles) (sous protection) (Salvia officinalis)

Unpublished

Sauge officinale (consommation des feuilles) (sous protection) (Salvia officinalis)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	None	None

SWITCH Schorseneren (open lucht) (Scorzonera hispanica)

Unpublished

Scorsonère (plein air) (Scorzonera hispanica)

Admission normale

alternariose, brûlure des feuilles de la carotte

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.8 kg/ha	2 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Stade de croissance à l'application: A partir du stade: "racines, tiges ou tubercules commencent à se développer (diamètre > 0.5 cm)" (BBCH 41)

Bee comment: A partir du stade: "racines, tiges ou tubercules commencent à se développer (diamètre > 0.5 cm)" (BBCH 41)

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.8 kg/ha	2 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Stade de croissance A partir du stade: "racines, tiges ou tubercules commencent à se

à l'application: développer (diamètre > 0.5 cm)" (BBCH 41)
Bee comment: A partir du stade: "racines, tiges ou tubercules commencent à se développer (diamètre > 0.5 cm)" (BBCH 41)

Sclérotiniose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.8 kg/ha	2 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Stade de croissance à l'application: A partir du stade: "racines, tiges ou tubercules commencent à se développer (diamètre > 0.5 cm)" (BBCH 41)

Bee comment: A partir du stade: "racines, tiges ou tubercules commencent à se développer (diamètre > 0.5 cm)" (BBCH 41)

SWITCH selderij (bleek-, groene en witte) (open lucht) (Apium graveolens var. dulce)

Unpublished

Céleri (à côtes, blanc et vert) (plein air) (Apium graveolens var. dulce)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	14 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Sclérotiniose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.8 kg/ha	2 applications	14 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

SWITCH Snijselder (consommation bladeren en/of stengels) (onder bescherming) (Apium graveolens var. secalinum)

Unpublished

Céleri à couper (consommation des feuilles et/ou tiges) (sous protection) (Apium graveolens var. secalinum)

Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques

DVP

SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).

None

SWITCH Snijselder (consommation bladeren en/of stengels) (open lucht) (Apium graveolens var. secalinum)

Unpublished

Céleri à couper (consommation des feuilles et/ou tiges) (plein air) (Apium graveolens var. secalinum)

Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques

DVP

SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).

None

SWITCH Stamslabonen (prinsesse-, snijboon) (groengeogst, met peul) (onder bescherming) (Phaseolus vulgaris)

Unpublished

Haricot vert (recolté frais, avec cosse) (sous protection) (Phaseolus vulgaris)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha pour une culture horizontale ou 1 kg/ha de haie pour une culture verticale	2 applications	14 jours	None	None
Maximum total dose: 2 applications / culture				
Stade de croissance à l'application: pendant la floraison (BBCH 60-69)				
Bee comment: pendant la floraison (BBCH 60-69)				

Sclérotiniose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha pour une culture horizontale ou 1 kg/ha de haie pour une culture verticale	2 applications	14 jours	None	None
Maximum total dose: 2 applications / culture				
Stade de croissance à l'application: pendant la floraison (BBCH 60-69)				
Bee comment: pendant la floraison (BBCH 60-69)				

SWITCH Stekelbes (kruisbes) en kruisingen (open lucht) (Ribes uva-crispa)

Unpublished

Groseilliers à maquereau et hybrides (plein air) (Ribes uva-crispa)

Admission normale

Anthracnose du groseillier

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.5 kg/ha de haie	3 applications	7 jours	Zone tampon de 10 m avec technique classique	None
Maximum total dose: 3 applications / 12 mois				

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.5 kg/ha de haie	3 applications	7 jours	Zone tampon de 10 m avec technique classique	None

Maximum total dose:
3 applications / 12 mois

SWITCH Thym (consommation des feuilles et/ou tiges)(plein air) (Thymus sp.)

Unpublished

Thym (consommation des feuilles et/ou tiges)(plein air) (Thymus sp.)
Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques	DVP
SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).	None

SWITCH Thym (consommation des feuilles et/ou tiges)(sous protection) (Thymus sp.)

Unpublished

Thym (consommation des feuilles et/ou tiges)(sous protection) (Thymus sp.)
Admission normale

Pourriture grise

Mesures et contrôles des risques	DVP
SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).	None

SWITCH Thym (consommation des feuilles) (plein air) (Thymus sp.)

Unpublished

Thym (consommation des feuilles) (plein air) (Thymus sp.)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

SWITCH Thym (consommation des feuilles)(sous protection) (Thymus sp.)

Unpublished

Thym (consommation des feuilles)(sous protection) (Thymus sp.)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	2 applications	7 jours	None	None

SWITCH Tomate (sous protection) (Solanum lycopersicum)

Unpublished

Tomate (sous protection) (Solanum lycopersicum)
Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.457 kg/ha de haie	3 applications	3 jours	None	None
Period of use:	préventif			
Restriction of Use:	préventif			

SWITCH valériane (consommation de la racine) (plein air) (Valeriana officinalis)

Unpublished

valériane (consommation de la racine) (plein air) (Valeriana officinalis)

Admission normale

alternariose, brûlure des feuilles de la carotte

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.8 kg/ha	3 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

3 applications / culture

Sclérotiniose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.8 kg/ha	3 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

3 applications / culture

SWITCH veenbessen (open lucht) (Vaccinium vitis-idaea & V. macrocarpon)

Unpublished

Airelles canneberges (plein air) (Vaccinium vitis-idaea & V. macrocarpon)

Admission normale

Anthraxose du groseillier

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.5 kg/ha de haie	3 applications	7 jours	Zone tampon de 10 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

3 applications / 12 mois

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.5 kg/ha de haie	3 applications	7 jours	Zone tampon de 10 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

3 applications / 12 mois

SWITCH Veldsla (onder bescherming) (Valerianella locusta)

Unpublished

Mâche (sous protection) (Valerianella locusta)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.6 kg/ha	3 applications	7 jours	None	None

SWITCH Vicia-bonen (paarde-, duive-, tuin-,...) (drooggeogst) (open lucht) (Vicia faba)

Unpublished

Fèves et féveroles (recoltées sèches) (plein air) (Vicia faba)

Admission normale

Anthraxnose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	14 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Stade de croissance pendant la floraison (BBCH 60-69)

à l'application:

Bee comment: pendant la floraison (BBCH 60-69)

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	14 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Stade de croissance pendant la floraison (BBCH 60-69)

à l'application:

Bee comment: pendant la floraison (BBCH 60-69)

Sclérotiniose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	14 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Stade de croissance pendant la floraison (BBCH 60-69)

à l'application:

Bee comment: pendant la floraison (BBCH 60-69)

[SWITCH Vigne \(pour production de vin\) \(plein air\) \(Vitis vinifera\)](#)

Unpublished

Vigne (pour production de vin) (plein air) (Vitis vinifera)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.83 kg/ha de haie	21 jours	Zone tampon de 10 m avec technique classique	None

Stade de croissance fin de la floraison - véraison (BBCH 69-85)

à l'application:

Bee comment: fin de la floraison - véraison (BBCH 69-85)

SWITCH vigne (raisins de table) (plein air) (Vitis vinifera)

Unpublished

vigne (raisins de table) (plein air) (Vitis vinifera)

Admission normale

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.83 kg/ha de haie	21 jours	Zone tampon de 10 m avec technique classique	None

Stade de croissance fin de la floraison - véraison (BBCH 69-85)

à l'application:

Bee comment: fin de la floraison - véraison (BBCH 69-85)

SWITCH Voedererwten (drooggeogst) (open lucht) (Pisum sativum subsp. arvense)

Unpublished

Pois fourragers (récoltés secs) (plein air) (Pisum sativum subsp. arvense)

Admission normale

Anthraxose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	14 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Stade de croissance pendant la floraison (BBCH 60-69)

à l'application:

Bee comment: pendant la floraison (BBCH 60-69)

Pourriture grise

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	14 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Stade de croissance à l'application: pendant la floraison (BBCH 60-69)

Bee comment: pendant la floraison (BBCH 60-69)

Sclérotiniose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
1 kg/ha	2 applications	14 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:

2 applications / culture

Stade de croissance à l'application: pendant la floraison (BBCH 60-69)

Bee comment: pendant la floraison (BBCH 60-69)

SWITCH Witloof en roodloof (forcerie grondteelt) (Cichorium intybus var. foliosum)

Unpublished

Witloof et chicon rouge (forcerie en fosse) (Cichorium intybus var. foliosum)

Admission normale

Sclérotiniose

Dose maximale par traitement	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
4.5 g/m ²	21 jours	None	None

Maximum total dose:

1 application / culture

Period of use: à la mise en place, sur le collet des racines

Restriction of Use: à la mise en place, sur le collet des racines

SWITCH Witloof en roodloof (forcerie hydrocultuur) (Cichorium intybus var. foliosum)

Unpublished

Witloof et chicon rouge (forcerie hydroponique) (Cichorium intybus var. foliosum)

Admission normale

Sclérotiniose

Dose maximale par traitement	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
4.5 g/m ²	21 jours	None	None

Maximum total dose:

1 application / culture

Period of use: à la mise en place, sur le collet des racines

Restriction of Use: à la mise en place, sur le collet des racines

SWITCH Witloofwortels (bewaring) (Cichorium intybus var. foliosium)

Unpublished

Racines de witloof (conservation) (Cichorium intybus var. foliosum)

Admission normale

Sclérotiniose

Dose maximale par traitement	Mesures et contrôles des risques	DVP
36 g/ton ou 90 g/100 l	SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).	None

Maximum total dose:

1 application / culture

Period of use: nébulisation sur la bande transporteuse ou trempage pendant 1-2 minutes avant de mettre dans la chambre de conservation

SWITCH Wortelen (open lucht) (Daucus carota)

Unpublished

Carottes (plein air) (Daucus carota)

Admission normale

alternariose, brûlure des feuilles de la carotte

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.8 kg/ha	3 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:
3 applications / culture

Sclérotiniose

Dose maximale par traitement	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Mesures et contrôles des risques	DVP
0.8 kg/ha	3 applications	7 jours	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique	None

Maximum total dose:
3 applications / culture

SWITCH wortelpeterselie (consomptie wortels) (open lucht) (Petroselinum crispum var. tuberosum)

Unpublished

Persil à grosses racines (consommation de la racine) (plein air) (Petroselinum crispum var. tuberosum)

Admission normale

alternariose, brûlure des feuilles de la carotte

Mesures et contrôles des risques	DVP
SPE3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).	None

Rhizoctone

Mesures et contrôles des risques	DVP
SPE3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).	None

Sclérotiniose

Mesures et contrôles des risques**DVP**

SPE3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).

None

Classification and Security

Alerte

GHS09, GHS07

Mentions de danger

• EUH401, H410, H317

Conseils de Prudence et Mesures de Gestions des risques

• P280, P302+P352, P261, SP1, P333+P313, P391