

OLYMPUS Épeautre (production de semences) (Triticum spelta)

Unpublished

Épeautre (production de semences) (Triticum spelta)

Admission normale

rhynchosporiose

Dose maximale par traitement	Maximum total dose	Maximum number of applications	Mesures et contrôles des risques
2.5 l/ha	2 applications / culture	2 applications	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

Stade de croissance à l'application: 2ème noeud - fin épisaison (BBCH 32-59)

Rouille brune

Dose maximale par traitement	Maximum total dose	Maximum number of applications	Mesures et contrôles des risques
2.5 l/ha	2 applications / culture	2 applications	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

Stade de croissance à l'application: 2ème noeud - fin épisaison (BBCH 32-59)

Rouille jaune

Dose maximale par traitement	Maximum total dose	Maximum number of applications	Mesures et contrôles des risques
2.5 l/ha	2 applications / culture	2 applications	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

Stade de croissance à l'application: 2ème noeud - fin épisaison (BBCH 32-59)

Septoriose de l'épi

Dose maximale par traitement	Maximum total dose	Maximum number of applications	Mesures et contrôles des risques
2.5 l/ha	2 applications / culture	2 applications	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

Stade de croissance à l'application: 2ème noeud - fin épiaison (BBCH 32-59)

Septoriose des feuilles

Dose maximale par traitement	Maximum total dose	Maximum number of applications	Mesures et contrôles des risques
2.5 l/ha	2 applications / culture	2 applications	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

Stade de croissance à l'application: 2ème noeud - fin épiaison (BBCH 32-59)