

België

Published on *Syngenta België* (<https://www.syngenta.be>)

[Home](#) > FUBOL GOLD

FUBOL GOLD



FUBOL GOLD

Laatste update:

13.06.2019

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer:

9475P/B

Samenstelling:

3.88 %

metalaxyl-m

64 %

mancozeb

Formulering:

WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Product CP: Tabs

- [Registraties](#)

[Registraties](#)

[FUBOL GOLD Aardappelen \(open lucht\) \(Solanum tuberosum\)](#)

Unpublished

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Reguliere toelating

phytophthora

Maximale dosering per behandeling	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Risico beperkende maatregelen
2.5 kg/ha	2 toepassingen	14 dagen	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

FUBOL GOLD Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Unpublished

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)
Reguliere toelating

phytophthora

Maximale dosering per behandeling	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Risico beperkende maatregelen
2.5 kg/ha	2 toepassingen	14 dagen	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

FUBOL GOLD Basilicum (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Ocimum basilicum)

Unpublished

Basilicum (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Ocimum basilicum)
Reguliere toelating

Valse meeldauw

Risico beperkende maatregelen

SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

Restriction of Use: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

FUBOL GOLD Basilicum (consumptie bladeren) (open lucht) (Ocimum basilicum)

Unpublished

Basilicum (consumptie bladeren) (open lucht) (Ocimum basilicum)
Reguliere toelating

Valse meeldauw

Maximale dosering per behandeling	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Risico beperkende maatregelen
1.9 kg/ha	3 toepassingen	14 dagen	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Restriction of Use:	Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.		

FUBOL GOLD Basilicum (consumptie bladeren) en eetbare bloemen (consumptie bloemen) (open lucht) (Ocimum basilicum and edible flowers)

Unpublished

Basilicum (consumptie bladeren) en eetbare bloemen (consumptie bloemen) (open lucht) (Ocimum basilicum and edible flowers)

Reguliere toelating

Valse meeldauw

Maximale dosering per behandeling	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Risico beperkende maatregelen
1.9 kg/ha	3 toepassingen	14 dagen	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Restriction of Use:	Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.		

FUBOL GOLD Bloemkool (witte en groene) (open lucht) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cauliflora)

Unpublished

Bloemkool (witte en groene) (open lucht) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cauliflora)

Reguliere toelating

Witte roest

Maximale dosering per behandeling	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Risico beperkende maatregelen
2 kg/ha	3 toepassingen	28 dagen	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Period of use:	vanaf het verschijnen van de eerste symptomen		

FUBOL GOLD Bosuien (lente-ui) (open lucht) (Allium fistulosum/ A. cepa)

Unpublished

Bosuien (lente-ui) (open lucht) (Allium fistulosum/ A. cepa)

Reguliere toelating

Valse meeldauw

Maximale dosering per behandeling	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Risico beperkende maatregelen
1.5 kg/ha	3 toepassingen	14 dagen	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Period of use:	preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen		

FUBOL GOLD Broccoli (open lucht) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa)

Unpublished

Broccoli (open lucht) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa)

Reguliere toelating

Witte roest

Maximale dosering per behandeling	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Risico beperkende maatregelen
2 kg/ha	3 toepassingen	28 dagen	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Period of use:	vanaf het verschijnen van de eerste symptomen		

FUBOL GOLD druivelaars (tafeldruiven) (open lucht) (Vitis vinifera)

Unpublished

druivelaars (tafeldruiven) (open lucht) (Vitis vinifera)

Reguliere toelating

Valse meeldauw

Maximale dosering per behandeling	Maximum total dose	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Risico beperkende maatregelen
0.75 kg/ha haag	3 toepassingen / 12 maanden	3 toepassingen	56 dagen	Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Period of use:	preventief			

FUBOL GOLD druivelaars (voor wijnproductie) (open lucht) (Vitis vinifera)

Unpublished

druivelaars (voor wijnproductie) (open lucht) (Vitis vinifera)
Reguliere toelating

Valse meeldauw

Maximale dosering per behandeling	Maximum total dose	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Risico beperkende maatregelen
0.75 kg/ha haag	3 toepassingen / 12 maanden	3 toepassingen	56 dagen	Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Period of use:	preventief			

FUBOL GOLD gewone bernagie (consumptie van de bloemen) (open lucht) (Borago officinalis)

Unpublished

gewone bernagie (consumptie van de bloemen) (open lucht) (Borago officinalis)
Reguliere toelating

Valse meeldauw

Maximale dosering per behandeling	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Risico beperkende maatregelen
1.9 kg/ha	3 toepassingen	14 dagen	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Restriction of Use:	Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.		

FUBOL GOLD Knoflook (open lucht) (Allium sativum)

Unpublished

Knoflook (open lucht) (Allium sativum)

Reguliere toelating

Valse meeldauw

Maximale dosering per behandeling	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Risico beperkende maatregelen
2 kg/ha	3 toepassingen	28 dagen	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Period of use:	preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen		

FUBOL GOLD Koolrabi (koolraap-boven-de-grond) (open lucht) (Brassica oleracea var. gongylodes)

Unpublished

Koolrabi (koolraap-boven-de-grond) (open lucht) (Brassica oleracea var. gongylodes)

Reguliere toelating

Witte roest

Maximale dosering per behandeling	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Risico beperkende maatregelen
2 kg/ha	2 toepassingen	14 dagen	Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Period of use:	vanaf het verschijnen van de eerste symptomen		

FUBOL GOLD Peterselie (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming) (Petroselinum crispum)

Unpublished

Peterselie (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming) (Petroselinum crispum)

Reguliere toelating

Valse meeldauw

Risico beperkende maatregelen

SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

Period of use:	preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen
Restriction of Use:	Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

FUBOL GOLD Peterselie (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Petroselinum crispum)

Unpublished

Peterselie (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Petroselinum crispum)

Reguliere toelating

Valse meeldauw

Risico beperkende maatregelen

SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

Restriction of Use: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

FUBOL GOLD Peterselie (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Petroselinum crispum)

Unpublished

Peterselie (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Petroselinum crispum)

Reguliere toelating

Valse meeldauw

Maximale dosering per behandeling

Pre Harvest Interval (PHI)

Risico beperkende maatregelen

1.9 kg/ha

28 dagen

SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

Period of use: preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen

Restriction of Use: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

FUBOL GOLD Peterselie (consumptie bladeren) (open lucht) (Petroselinum crispum)

Unpublished

Peterselie (consumptie bladeren) (open lucht) (Petroselinum crispum)

Reguliere toelating

Valse meeldauw

Maximale dosering per behandeling	Pre Harvest Interval (PHI)	Risico beperkende maatregelen
-----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

1.9 kg/ha	14 dagen	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
-----------	----------	--

Restriction of Use: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

FUBOL GOLD Rabarber (open lucht) (Rheum rhabarbarum)

Unpublished

Rabarber (open lucht) (Rheum rhabarbarum)

Reguliere toelating

Walse meeldauw

Maximale dosering per behandeling	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Risico beperkende maatregelen
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------------

1.9 kg/ha	3 toepassingen	21 dagen	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
-----------	----------------	----------	--

FUBOL GOLD Radijs (open lucht) (Raphanus sativus var. radicula)

Unpublished

Radijs (open lucht) (Raphanus sativus var. radicula)

Reguliere toelating

Witte roest

Maximale dosering per behandeling	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Risico beperkende maatregelen
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------------

2 kg/ha	2 toepassingen	14 dagen	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
---------	----------------	----------	--

FUBOL GOLD Rammenas en rettich (open lucht) (Raphanus sativus var. niger)

Unpublished

Rammenas en rettich (open lucht) (Raphanus sativus var. niger)

Reguliere toelating

Witte roest

Maximale dosering per behandeling	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Risico beperkende maatregelen
2 kg/ha	2 toepassingen	14 dagen	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

FUBOL GOLD Rucola (onder bescherming) (Eruca sativa/Diplotaxis spp.)

Unpublished

Rucola (onder bescherming) (Eruca sativa/Diplotaxis spp.)
Reguliere toelating

Valse meeldauw

Maximale dosering per behandeling	Maximum total dose	Pre Harvest Interval (PHI)	Risico beperkende maatregelen
1.9 kg/ha	3 toepassingen / 12 maanden	28 dagen	SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

FUBOL GOLD Rucola (open lucht) (Eruca sativa/Diplotaxis spp.)

Unpublished

Rucola (open lucht) (Eruca sativa/Diplotaxis spp.)
Reguliere toelating

Valse meeldauw

Maximale dosering per behandeling	Maximum total dose	Pre Harvest Interval (PHI)	Risico beperkende maatregelen
1.9 kg/ha	3 toepassingen / 12 maanden	28 dagen	Bufferzone van 5 m met klassieke techniek

FUBOL GOLD Salie (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Salvia officinalis)

Unpublished

Salie (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Salvia officinalis)

Reguliere toelating

Valse meeldauw

Risico beperkende maatregelen

SPE3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

Restriction of Use: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

FUBOL GOLD Salie (consumptie bladeren) (open lucht) (Salvia officinalis)

Unpublished

Salie (consumptie bladeren) (open lucht) (Salvia officinalis)

Reguliere toelating

Valse meeldauw

Maximale dosering per behandeling	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Risico beperkende maatregelen
1.9 kg/ha	3 toepassingen	14 dagen	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Restriction of Use: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.			

FUBOL GOLD Schorseneren (open lucht) (Scorzonera hispanica)

Unpublished

Schorseneren (open lucht) (Scorzonera hispanica)

Reguliere toelating

Witte roest

Maximale dosering per behandeling	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Risico beperkende maatregelen
2.5 kg/ha	4 toepassingen	60 dagen	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Period of use: bij het verschijnen van de eerste symptomen			

FUBOL GOLD Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming) (ornamentals)

Unpublished

Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming) (ornamentals)
Reguliere toelating

Blad-en takphytophthora en valse meeldauw

Maximale dosering per behandeling	Maximum total dose	Maximum number of applications	Risico beperkende maatregelen
0.25 kg/100 l water	2 toepassingen / 12 maanden	2 toepassingen	SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
Period of use:	preventief bij het verschijnen van eerste symptomen		

FUBOL GOLD Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) (ornamentals)

Unpublished

Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) (ornamentals)
Reguliere toelating

Blad-en takphytophthora en valse meeldauw

Maximale dosering per behandeling	Maximum total dose	Maximum number of applications	Risico beperkende maatregelen
0.25 kg/100 l water	2 toepassingen / 12 maanden	2 toepassingen	Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Period of use:	preventief bij het verschijnen van eerste symptomen		

FUBOL GOLD Sjalot (open lucht) (Allium cepa Aggregatum types)

Unpublished

Sjalot (open lucht) (Allium cepa Aggregatum types)
Reguliere toelating

Valse meeldauw

Maximale dosering per behandeling	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Risico beperkende maatregelen
2 kg/ha	3 toepassingen	14 dagen	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Period of use:	preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen		

FUBOL GOLD Slasoorten (onder bescherming) (Lactuca sp.)

Unpublished

Slasoorten (onder bescherming) (Lactuca sp.)
Reguliere toelating

Valse meeldauw

Maximale dosering per behandeling	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Risico beperkende maatregelen
1.9 kg/ha	2 toepassingen	28 dagen	SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

FUBOL GOLD Slasoorten (open lucht) (Lactuca sp.)

Unpublished

Slasoorten (open lucht) (Lactuca sp.)
Reguliere toelating

Valse meeldauw

Maximale dosering per behandeling	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Risico beperkende maatregelen
1.9 kg/ha	2 toepassingen	28 dagen	Bufferzone van 5 m met klassieke techniek

FUBOL GOLD Spruitkool (open lucht) (Brassica oleracea var. gemmifera)

Unpublished

Spruitkool (open lucht) (Brassica oleracea var. gemmifera)
Reguliere toelating

Witte roest

Maximale dosering per behandeling	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Risico beperkende maatregelen
2 kg/ha	3 toepassingen	28 dagen	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Period of use:	vanaf het verschijnen van de eerste symptomen		

FUBOL GOLD Tabak (open lucht) (Nicotiana tabacum)

Unpublished

Tabak (open lucht) (Nicotiana tabacum)
Reguliere toelating

Valse meeldauw /blauwe schimmel

Maximale dosering per behandeling	Maximum number of applications	Risico beperkende maatregelen
2.5 kg/ha	2 toepassingen	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

FUBOL GOLD Uien (drooggeogste) (open lucht) (Allium cepa)

Unpublished

Uien (drooggeogste) (open lucht) (Allium cepa)
Reguliere toelating

Valse meeldauw

Maximale dosering per behandeling	Maximum number of applications	Pre Harvest Interval (PHI)	Risico beperkende maatregelen
2 kg/ha	3 toepassingen	14 dagen	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Period of use:	preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen		